



चला, शिकूया.

- बहुपदीची ओळख
- बहुपदींवरील क्रिया
- बहुपदीची कोटी
- संश्लेषक भागाकार
- बहुपदीची किंमत
- शेषसिद्धांत



चला, चर्चा करूया.

$p^3 - \frac{1}{2}p^2 + p$  ;  $m^2 + 2n^3 - \sqrt{3}m^5$ ; 6 या सर्व बैजिक राशी आहेत.

**शिक्षक** : विद्यार्थी मित्रांनो,  $p^3 - \frac{1}{2}p^2 + p$  ,  $m^2 + 2n^3 - \sqrt{3}m^5$  , 6 या प्रत्येक राशीतील एकेक पद घ्या. त्या पदातील चलांचे घातांक सांगा.

**माधुरी** :  $p^3 - \frac{1}{2}p^2 + p$  या राशीतील पदांच्या चलांचे घातांक अनुक्रमे 3, 2, 1 आहेत.

**विवेक** : सर,  $m^2 + 2n^3 - \sqrt{3}m^5$  या राशीतील पदांच्या चलांचे घातांक अनुक्रमे 2, 3, 5 आहेत.

**रोहित** : सर, 6 या राशीमध्ये चल नाही. येथे  $6 = 6 \times 1 = 6 \times x^0$  असे लिहिता येते, म्हणून 6 या राशीतील चलाचा घातांक 0 आहे.

**शिक्षक** : म्हणजे वरील सर्व राशींमध्ये चलांचे घातांक धनपूर्णांक किंवा शून्य, म्हणजेच पूर्ण संख्या आहेत. ज्या बैजिक राशीमध्ये चलांचे घातांक पूर्ण संख्या असतात, त्या राशीला **बहुपदी (polynomial)** असे म्हणतात. 6 ही सुद्धा बहुपदी आहे. 6, -7,  $\frac{1}{2}$ , 0,  $\sqrt{3}$  इत्यादी स्थिर संख्यांना **स्थिर बहुपदी (Constant polynomial)** म्हणतात.

$\sqrt{y} + 5$  व  $\frac{1}{y} - 3$  या बहुपदी आहेत काय ?

**सारा** : सर,  $\sqrt{y} + 5$  ही बहुपदी नाही. कारण  $\sqrt{y} + 5 = y^{\frac{1}{2}} + 5$ , यामध्ये  $y$  चा घातांक  $\frac{1}{2}$  असून ती पूर्ण संख्या नाही.


**जॉन** : सर,  $\frac{1}{y} - 3$  ही सुद्धा बहुपदी नाही. कारण  $\frac{1}{y} - 3 = y^{-1} - 3$ , येथे  $y$  चा घातांक -1 असून ती पूर्ण संख्या नाही.

**शिक्षक** : बहुपदी नसलेल्या कोणत्याही पाच बैजिक राशी लिहून त्या बहुपदी का नाहीत याचे स्पष्टीकरण द्या.

खालील प्रश्नांची उत्तरे वेगवेगळी उदाहरणे घेऊन व त्यांवर चर्चा करून शोधा.

- प्रत्येक बैजिक राशी ही बहुपदी असते काय ?
- प्रत्येक बहुपदी ही बैजिक राशी असते काय ?

## बहुपदीचे प्रकार (पदांच्या संख्येवरून)



एका चलातील बहुपदी तिच्यातील चलानुसार  $p(x)$ ,  $q(m)$ ,  $r(y)$  अशा प्रकारे दर्शवतात.

$$\text{उदाहरणार्थ } p(x) = x^3 + 2x^2 + 5x - 3 \quad q(m) = m^2 + \frac{1}{2}m - 7 \quad r(y) = y^2 + 5$$



जाणून घेऊया.

### एका चलातील बहुपदीची कोटी (Degree of a polynomial in one variable)

शिक्षक :  $2x^7 - 5x + 9$  या बहुपदीतील चलाचा सर्वात मोठा घातांक कोणता आहे ?

जिजा : सर, सर्वात मोठा घातांक 7 आहे.

शिक्षक : एका चलातील बहुपदीमध्ये, चलाच्या सर्वात मोठ्या घातांकास त्या बहुपदीची कोटी म्हणतात. मग सांगा बरं, वरील बहुपदीची कोटी किती ?

अशोक : सर,  $2x^7 - 5x + 9$  या बहुपदीची कोटी 7 आहे.

शिक्षक : 10 या बहुपदीची कोटी किती ?

राधा :  $10 = 10 \times 1 = 10 \times x^0$  म्हणून 10 या बहुपदीची कोटी 0 आहे.

शिक्षक : 10 प्रमाणेच कोणत्याही शून्येतर स्थिर बहुपदीची कोटी 0 असते.

शून्य बहुपदीची कोटी निश्चित करता येत नाही.

### एकापेक्षा अधिक चलांतील बहुपदीची कोटी

बहुपदीमधील प्रत्येक पदामध्ये असलेल्या चलांच्या घातांकांची जी बेरीज सर्वाधिक असते, त्या बेरजेस त्या बहुपदीची कोटी म्हणतात.

उदा.  $3m^3n^6 + 7m^2n^3 - mn$  ही दोन चलांतील बहुपदी आहे. या बहुपदीची कोटी 9 आहे.


(येथे घातांकांच्या बेरजा  $3 + 6 = 9$ ,  $2 + 3 = 5$ ,  $1 + 1 = 2$ )

**कृती I :** चल  $x$  व कोटी 5 असलेल्या एकपदी, द्विपदी व त्रिपदीचे प्रत्येकी एक उदाहरण लिहा.

एकपदी  द्विपदी  त्रिपदी

**कृती II :** 5 कोटी असलेल्या दोन चलांतील एका द्विपदीचे उदाहरण तयार करा.

### बहुपदीचे प्रकार (कोटीवरून)



**बहुपदी :**  $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$  ही  $x$  या चलातील कोटी  $n$  असलेली बहुपदी

आहे. येथे  $a_n, a_{n-1}, \dots, a_2, a_1, a_0$  हे सहगुणक असून  $a_n \neq 0$

### बहुपदीचे प्रमाणरूप, सहगुणक रूप व घातांक रूप

(Standard form, coefficient form and index form of a polynomial)

$p(x) = x - 3x^2 + 5 + x^4$  ही बहुपदी  $x$  च्या घातांकांच्या उतरत्या क्रमाने  $x^4 - 3x^2 + x + 5$  अशी लिहिता येईल. हे प्रमाणरूप आहे. या बहुपदीत  $x$  च्या तिसऱ्या घाताचे पद नाही. म्हणजेच ते  $0x^3$  आहे असे मानता येते. हे पद घेऊन  $p(x)$  ही बहुपदी  $x^4 + 0x^3 - 3x^2 + x + 5$  अशी लिहिता येईल. अशा प्रकारे घातांकांच्या उतरत्या क्रमाने लिहिलेल्या व घातांकांची सर्व पदे उल्लेखलेल्या बहुपदीला घातांकरूप म्हणतात.

काही वेळा घातांकरूपातील बहुपदी मधले चल अध्याहत मानून तिचे फक्त सहगुणक क्रमाने लिहितात, उदाहरणार्थ  $x^3 - 3x^2 + 0x - 8$  ही बहुपदी  $(1, -3, 0, -8)$  अशी लिहितात. याला बहुपदीचे सहगुणक रूप असे म्हणतात.

$(4, 0, -5, 0, 1)$  ही बहुपदी  $y$  हे चल वापरून घातांकरूपात  $4y^4 + 0y^3 - 5y^2 + 0y + 1$  म्हणजेच  $4y^4 - 5y^2 + 1$  अशी लिहिता येईल.

उदा.  $p(m) = 3m^5 - 7m + 5m^3 + 2$

बहुपदी घातांकाच्या उतरत्या क्रमाने लिहा.	$3m^5 + 5m^3 - 7m + 2$
बहुपदीत नसलेली पदे शून्य सहगुणक घेऊन समाविष्ट करा आणि ती घातांकरूपात लिहा.	$3m^5 + 0m^4 + 5m^3 + 0m^2 - 7m + 2$
दिलेल्या बहुपदीचे सहगुणक रूप लिहा.	$(3, 0, 5, 0, -7, 2)$
बहुपदीची कोटी लिहा.	5

उदा (1)  $x^3 + 3x - 5$  ही बहुपदी सहगुणक रूपात लिहा.

उकल :  $x^3 + 3x - 5 = x^3 + 0x^2 + 3x - 5$

∴ दिलेल्या बहुपदीचे सहगुणक रूप  $(1, 0, 3, -5)$

उदा (2)  $(2, -1, 0, 5, 6)$  ही सहगुणक रूपातील बहुपदी घातांकरूपात लिहा.

उकल : बहुपदीचे सहगुणक रूप  $(2, -1, 0, 5, 6)$

∴ घातांकरूपातील बहुपदी  $= 2x^4 - x^3 + 0x^2 + 5x + 6$

म्हणजेच  $2x^4 - x^3 + 5x + 6$

### सरावसंच 3.1

1. खालील राशी बहुपदी आहेत का ते लिहा. स्पष्टीकरण द्या.

- (i)  $y + \frac{1}{y}$       (ii)  $2 - 5\sqrt{x}$       (iii)  $x^2 + 7x + 9$   
 (iv)  $2m^2 + 7m - 5$       (v) 10

2. खालील प्रत्येक बहुपदीतील  $m^3$  चा सहगुणक लिहा.

- (i)  $m^3$       (ii)  $\frac{-3}{2} + m - \sqrt{3}m^3$       (iii)  $\frac{-2}{3}m^3 - 5m^2 + 7m - 1$

3. खालील माहितीवरून  $x$  हे चल वापरून प्रत्येकी एक बहुपदी लिहा.

- (i) कोटी 7 असलेली एकपदी      (ii) कोटी 35 असलेली द्विपदी      (iii) कोटी 8 असलेली त्रिपदी

4. खालील प्रत्येक बहुपदीची कोटी लिहा.

- (i)  $\sqrt{5}$       (ii)  $x^\circ$       (iii)  $x^2$       (iv)  $\sqrt{2}m^{10} - 7$       (v)  $2p - \sqrt{7}$   
 (vi)  $7y - y^3 + y^5$       (vii)  $xyz + xy - z$       (viii)  $m^3n^7 - 3m^5n + mn$

5. खालील बहुपदींचे रेषीय, वर्ग व घन बहुपदी याप्रकारे वर्गीकरण करा.

- (i)  $2x^2 + 3x + 1$       (ii)  $5p$       (iii)  $\sqrt{2}y - \frac{1}{2}$   
 (iv)  $m^3 + 7m^2 + \frac{5}{2}m - \sqrt{7}$       (v)  $a^2$       (vi)  $3r^3$

6. खालील बहुपदी प्रमाण रूपात लिहा.

- (i)  $m^3 + 3 + 5m$       (ii)  $-7y + y^5 + 3y^3 - \frac{1}{2} + 2y^4 - y^2$


7. खालील बहुपदी सहगुणक रूपात लिहा.

- (i)  $x^3 - 2$       (ii)  $5y$       (iii)  $2m^4 - 3m^2 + 7$       (iv)  $-\frac{2}{3}$

8. खालील सहगुणक रूपातील बहुपदी  $x$  चल वापरून प्रमाणरूपात लिहा.

- (i) (1, 2, 3)      (ii) (5, 0, 0, 0, -1)      (iii) (-2, 2, -2, 2)

9. खाली काही बहुपदी दिल्या आहेत. त्या बहुपदी दिलेल्या चौकटीत योग्य ठिकाणी लिहा.



(1) दोन सरूप बैजिक पदांची बेरीज किंवा वजाबाकी करताना त्यांच्या सहगुणकांची बेरीज किंवा वजाबाकी करतात. जसे,  $5m^3 - 7m^3 = (5 - 7)m^3 = -2m^3$

(2) दोन बैजिक पदांचा गुणाकार किंवा भागाकार करताना त्यांच्या सहगुणकांचा गुणाकार किंवा भागाकार होतो. तसेच घातांकांच्या नियमांचाही उपयोग होतो.

जसे,  $-4y^3 \times 2y^2z = -8y^5z$  ;  $12a^2b \div 3ab^2 = \frac{4a}{b}$



जाणून घेऊया.

### बहुपदींवरील क्रिया

बहुपदींची बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार व भागाकार या क्रिया बैजिक राशींवरील क्रियांप्रमाणेच करतात.

उदा (1)  $7a^2 + 5a + 6$  मधून  $5a^2 - 2a$  वजा करा.

$$\begin{aligned}\text{उकल : } & (7a^2 + 5a + 6) - (5a^2 - 2a) \\ & = 7a^2 + 5a + 6 - 5a^2 + 2a \\ & = \underline{7a^2 - 5a^2} + \underline{5a + 2a} + 6 \\ & = 2a^2 + 7a + 6\end{aligned}$$

उदा (2)  $-2a \times 5a^2 = -10a^3$

उदा (3)  $(m^2 - 5) \times (m^3 + 2m - 2) = ?$

उकल :  $(m^2 - 5) \times (m^3 + 2m - 2)$

$$\begin{aligned}& = m^2(m^3 + 2m - 2) - 5(m^3 + 2m - 2) \\ & = m^5 + 2m^3 - 2m^2 - 5m^3 - 10m + 10 \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} & = m^2(m^3 + 2m - 2) - 5(m^3 + 2m - 2) \\ & = m^5 + 2m^3 - 2m^2 - 5m^3 - 10m + 10 \end{aligned}} \right\} \begin{array}{l} \text{(पहिल्या बहुपदीतील प्रत्येक पदाने} \\ \text{दुसऱ्या बहुपदीस गुणले.)} \end{array} \\ & = m^5 + 2m^3 - 5m^3 - 2m^2 - 10m + 10 \quad \text{(सरूप पदांची एकत्र मांडणी केली.)} \\ & = m^5 - 3m^3 - 2m^2 - 10m + 10\end{aligned}$$

गुणाकाराची कोटी 5 आहे हे लक्षात ठेवूया.

उदा (4)  $3m^2n + 5mn^2 - 7mn$  आणि  $2m^2n - mn^2 + mn$  यांची बेरीज करा.

उकल :  $(3m^2n + 5mn^2 - 7mn) + (2m^2n - mn^2 + mn)$

$$\begin{aligned}& = 3m^2n + 5mn^2 - 7mn + 2m^2n - mn^2 + mn \\ & = \underline{3m^2n + 2m^2n} + \underline{5mn^2 - mn^2} - \underline{7mn + mn} \quad \text{(सरूप पदांची एकत्र मांडणी केली.)} \\ & = 5m^2n + 4mn^2 - 6mn \quad \text{(सरूप पदांची बेरीज केली.)}\end{aligned}$$



### विचार करूया.

एका बहुपदीची कोटी 3 व दुसऱ्या बहुपदीची कोटी 5 असेल तर बहुपदींच्या गुणाकाराची कोटी किती असेल ?

गुण्य व गुणक बहुपदींच्या कोटी आणि त्यांच्या गुणाकाराची कोटी यांच्यामध्ये कोणता संबंध असतो ?

उदा (5)  $(2 + 2x^2) \div (x + 2)$  हा भागाकार करा आणि भाज्य = भाजक  $\times$  भागाकार + बाकी या स्वरूपात उत्तर लिहा.

उकल : प्रथम  $p(x) = 2 + 2x^2$  ही भाज्य बहुपदी प्रमाण रूपात लिहू

$$\begin{array}{r} \therefore 2 + 2x^2 = 2x^2 + 0x + 2 \\ \text{रीत I : } \begin{array}{r} x + 2 \overline{) 2x^2 + 0x + 2} \\ \underline{- 2x^2 + 4x} \phantom{+ 2} \\ - 4x + 2 \\ \underline{- 4x - 8} \\ + \phantom{+} \\ \hline 10 \end{array} \end{array}$$

भाज्य = भाजक  $\times$  भागाकार + बाकी  
 $2 + 2x^2 = (x + 2) \times (2x - 4) + 10$   
 $q(x)$ , भाजक =  $(x + 2)$   
 $s(x)$ , भागाकार =  $2x - 4$  व  $r(x)$ , बाकी = 10  
 $\therefore p(x) = q(x) \times s(x) + r(x)$ .

रीत II : भागाकाराची रेषीय पद्धती

$(2x^2 + 2) \div (x + 2)$  हा भागाकार करा.

$2x^2$  हे पद मिळवण्यासाठी  $(x + 2)$  ला  $2x$  ने गुणून  $4x$  वजा करू.

$$2x(x+2) - 4x = 2x^2$$

$$\therefore \text{ भाज्य} = 2x^2 + 2 = 2x(x+2) - 4x + 2 \quad \dots(I)$$

आता  $-4x$  हे पद मिळवण्यासाठी  $(x+2)$  ला  $-4$  ने गुणू व 8 मिळवू.

$$-4(x+2) + 8 = -4x$$

$$\therefore (2x^2 + 2) = 2x(x+2) - 4(x+2) + 8 + 2 \quad \dots(I) \text{ वरून}$$

$$\therefore (2x^2 + 2) = (x + 2) (2x - 4) + 10$$

भाज्य = भाजक  $\times$  भागाकार + बाकी.



हे लक्षात ठेवूया.

### युक्लिडचा भागाकार सिद्धांत

जर  $s(x)$  आणि  $p(x)$  या दोन बहुपदी असतील आणि  $s(x)$  ची कोटी  $p(x)$  च्या कोटीएवढी किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल, आणि  $s(x)$  ला  $p(x)$  ने भागून येणारा भागाकार  $q(x)$  असेल, तर  $s(x) = p(x)q(x) + r(x)$ . येथे  $r(x) = 0$  किंवा  $r(x)$  ची कोटी  $p(x)$  च्या कोटीपेक्षा कमी असते.

### सरावसंच 3.2

- (1) दिलेली अक्षरे वापरून उत्तरे लिहा.
  - (i) लाट गावात  $a$  झाडे आहेत. झाडांची संख्या दरवर्षी  $b$  ने वाढते, तर  $x$  वर्षांनंतर त्या गावात किती झाडे असतील?
  - (ii) कवायतीसाठी एका रांगेत  $y$  मुले अशा  $x$  रांगा केल्या. तर कवायतीसाठी एकूण किती मुले हजर होती?
  - (iii) एका दोन अंकी संख्येच्या एकक व दशक स्थानाचा अंक अनुक्रमे  $m$  व  $n$  आहे, तर ती दोन अंकी संख्या दर्शवणारी बहुपदी कोणती?
- (2) खालील बहुपदींची बेरीज करा.
  - (i)  $x^3 - 2x^2 - 9$  ;  $5x^3 + 2x + 9$
  - (ii)  $-7m^4 + 5m^3 + \sqrt{2}$  ;  $5m^4 - 3m^3 + 2m^2 + 3m - 6$
  - (iii)  $2y^2 + 7y + 5$  ;  $3y + 9$  ;  $3y^2 - 4y - 3$
- (3) पहिल्या बहुपदीतून दुसरी बहुपदी वजा करा.
  - (i)  $x^2 - 9x + \sqrt{3}$  ;  $-19x + \sqrt{3} + 7x^2$
  - (ii)  $2ab^2 + 3a^2b - 4ab$  ;  $3ab - 8ab^2 + 2a^2b$
- (4) खालील बहुपदींचा गुणाकार करा.
  - (i)  $2x$  ;  $x^2 - 2x - 1$
  - (ii)  $x^5 - 1$  ;  $x^3 + 2x^2 + 2$
  - (iii)  $2y + 1$  ;  $y^2 - 2y^3 + 3y$
- (5) पहिल्या बहुपदीला दुसऱ्या बहुपदीने भागा व उत्तर 'भाज्य = भाजक  $\times$  भागाकार + बाकी' या रूपात लिहा.
  - (i)  $x^3 - 64$  ;  $x - 4$
  - (ii)  $5x^5 + 4x^4 - 3x^3 + 2x^2 + 2$  ;  $x^2 - x$
- (6\*) खालील माहिती पदावलीच्या रूपात लिहा. पदावलीला सोपे रूप द्या.
 

एका आयताकृती शेताची लांबी  $(2a^2 + 3b^2)$  मीटर आणि रुंदी  $(a^2 + b^2)$  मीटर आहे. शेतकऱ्याने शेतामध्ये  $(a^2 - b^2)$  मीटर बाजू असलेल्या चौरसाकृती जागेवर घर बांधले, तर उरलेल्या शेताचे क्षेत्रफळ किती?



**कृती :** खालील उतारा वाचा व चौकटीत योग्य राशी लिहा व चर्चा करा.

शिरळस गावी कोरडवाहू शेती करणाऱ्या गोविंदचे 5 एकर शेत आहे. त्याच्या घरी पत्नी, 2 मुले व त्याची वृद्ध आई आहे. त्याने शेतीसाठी बँकेचे सव्वा लाख रुपये कर्ज, द.सा.द.शे. 10 या दराने घेतले. त्याने शेतातील  $x$  एकर जमिनीत सोयाबीन आणि  $y$  एकर जमिनीत कापूस व तूर यांचे पीक घेतले. शेतीसाठी आलेला खर्च पुढीलप्रमाणे आहे.

बियाणांसाठी त्याने एकूण रु.10,000 दिले. सोयाबीन पिकासाठी खते व कीटकनाशके यांसाठी 2000  $x$  रुपये आणि मजुरी व मशागत यांसाठी 4000  $x^2$  रुपये खर्च झाला. कापूस व तूर या पिकांसाठी खते व कीटकनाशके यांचा खर्च 8000  $y$  रुपये आणि मजुरी व मशागत यांसाठी 9000  $y^2$  रुपये खर्च झाला.

शेतीसाठी एकूण खर्च किती आला ते  $x$  आणि  $y$  वापरून लिहू.

$$\boxed{\phantom{0000}} + \boxed{2000x} + \boxed{4000x^2} + \boxed{8000y} + \boxed{\phantom{0000}} \text{ रुपये}$$

त्याच्या शेतात सोयाबीनचे उत्पन्न 5  $x^2$  क्विंटल निघाले. ते 2800 रु. प्रतिक्विंटल प्रमाणे विकले गेले. कापसाचे उत्पन्न  $\frac{5}{3}y^2$  क्विंटल निघाले व ते 5000 रु. प्रतिक्विंटलप्रमाणे विकले गेले.

तुरीचे उत्पन्न 4 $y$  क्विंटल निघाले व ते 4000 रु. प्रतिक्विंटलप्रमाणे विकले.

सर्व शेतमालाची विक्री झाल्यावर त्यातून किती रुपये एकूण उत्पन्न आले.

ते  $x$  आणि  $y$  च्या पदावली रूपात लिहू.

$$\boxed{\phantom{0000}} + \boxed{\phantom{0000}} + \boxed{\phantom{0000}} \text{ रुपये}$$



जाणून घेऊया.

### संश्लेषक भागाकार पद्धती (Synthetic Division)

एका बहुपदीला दुसऱ्या बहुपदीने कसे भागायचे हे आपल्याला माहित आहे. आता आपण भाजक  $x + a$  किंवा  $x - a$  बहुपदी असेल तर भागाकाराची सोपी पद्धत समजून घेऊ.

**उदा (1)**  $(3x^3 + 2x^2 - 1)$  या बहुपदीला  $(x + 2)$  ने भागा.

**उकल :** प्रथम भाज्य बहुपदी प्रमाण रूपात लिहून नंतर ती सहगुणक रूपात लिहू.


$$\text{भाज्याचे प्रमाणरूप : } 3x^3 + 2x^2 - 1 = 3x^3 + 2x^2 + 0x - 1$$

$$\therefore \text{भाज्य बहुपदीचे सहगुणक रूप} = (3, 2, 0, -1)$$


$$\text{भाजक बहुपदी} = x + 2$$

खालील पायऱ्यांनी संश्लेषक पद्धतीने भागाकार करू.

- (1) बाजूला दाखवल्याप्रमाणे एक उभी व एक आडवी अशा दोन रेषा काढू.




- (2) भाजक  $x + 2$  असून 2 ची विरुद्ध संख्या  $-2$  आहे.  $\therefore$  पहिल्या ओळीत उभ्या रेषेच्या डावीकडे  $-2$  लिहू. आडव्या रेषेच्या वर पहिल्या ओळीत भाज्य बहुपदीचे सहगुणक रूप लिहू.



- (3) आडव्या रेषेच्या खाली म्हणजे तिसऱ्या ओळीत भाज्यातील पहिला सहगुणक तसाच लिहू.

- (4) तिसऱ्या ओळीतील 3 व भाजकातील  $-2$  यांचा गुणाकार  $-6$ . हा दुसऱ्या ओळीतील 2 या सहगुणकाखाली लिहू. नंतर 2 आणि  $-6$  यांची बेरीज  $-4$  ही तिसऱ्या ओळीत खाली लिहू.



याप्रमाणे गुणाकार व बेरजा करून; शेवटची बेरीज करून आलेली संख्या ही भागाकारातील बाकी असते. येथे बाकी  $- 17$  आहे.

(3,  $- 4$ , 8) हे भागाकाराचे सहगुणक रूप होय.

$$\therefore \text{भागाकार} = 3x^2 - 4x + 8 \text{ व बाकी} = - 17$$

$$\therefore 3x^3 + 2x^2 - 1 = (x + 2)(3x^2 - 4x + 8) - 17$$

या पद्धतीला **भागाकाराची संश्लेषक पद्धत** म्हणतात.

हा भागाकार रेषीय पद्धतीने पुढीलप्रमाणे करता येईल.

$$\begin{aligned} 3x^3 + 2x^2 - 1 &= 3x^2(x + 2) - 6x^2 + 2x^2 - 1 \\ &= 3x^2(x + 2) - 4x^2 - 1 \\ &= 3x^2(x + 2) - 4x^2 - 8x + 8x - 1 \\ &= 3x^2(x + 2) - 4x(x + 2) + 8x - 1 \\ &= 3x^2(x + 2) - 4x(x + 2) + 8x + 16 - 16 - 1 \\ &= 3x^2(x + 2) - 4x(x + 2) + 8(x + 2) - 17 \end{aligned}$$

$$\therefore 3x^3 + 2x^2 - 1 = (x + 2)(3x^2 - 4x + 8) - 17$$

उदा (2)  $(2y^4 - 3y^3 + 5y - 4) \div (y - 1)$  हा भागाकार करा.

उकल : संश्लेषक पद्धत : भाज्य =  $2y^4 - 3y^3 + 5y - 4 = 2y^4 - 3y^3 + 0y^2 + 5y - 4$

भाजक =  $y - 1$   $-1$  ची विरुद्ध संख्या 1 आहे.

1	2	- 3	0	5	- 4	
		2	- 1	- 1	4	
	2	- 1	- 1	4	0	बाकी

भागाकाराचे सहगुणक रूप  $(2, -1, -1, 4)$  आहे.

$\therefore$  भागाकार =  $2y^3 - y^2 - y + 4$  व बाकी = 0

रेषीय पद्धत :  $2y^4 - 3y^3 + 5y - 4 = 2y^3(y - 1) + 2y^3 - 3y^3 + 5y - 4$

$$= 2y^3(y - 1) - y^2(y - 1) - y^2 + 5y - 4$$

$$= 2y^3(y - 1) - y^2(y - 1) - y(y - 1) + 4y - 4$$

$$= (2y^3 - y^2 - y + 4)(y - 1)$$



हे लक्षात ठेवूया.

संश्लेषक पद्धतीने भागाकार करताना फक्त  $x + a$  किंवा  $x - a$  या रूपातील ज्या बहुपदीची कोटी 1 आहे असेच भाजक घेतले आहेत.

### सरावसंच 3.3

1. खालील भागाकार संश्लेषक पद्धतीने आणि रेषीय पद्धतीने करा. भागाकार आणि बाकी लिहा.

(i)  $(2m^2 - 3m + 10) \div (m - 5)$       (ii)  $(x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 4x + 5) \div (x + 2)$

(iii)  $(y^3 - 216) \div (y - 6)$       (iv)  $(2x^4 + 3x^3 + 4x - 2x^2) \div (x + 3)$

(v)  $(x^4 - 3x^2 - 8) \div (x + 4)$       (vi)  $(y^3 - 3y^2 + 5y - 1) \div (y - 1)$



जाणून घेऊया.

### बहुपदीची किंमत (Value of polynomial)

बहुपदीतील चलाला एखादी किंमत दिली की त्या बहुपदीचीही एक किंमत मिळते. उदाहरणार्थ,  $x + 7$  या बहुपदीत  $x$  ला 2 ही किंमत दिली, तर त्या बहुपदीची 9 ही किंमत मिळते.

$p(x)$  या बहुपदीत  $x$  ला  $a$  ही किंमत देऊन येणारी बहुपदीची किंमत  $p(a)$  ने दर्शवतात.

उदा (1)  $p(x) = 2x^2 - 3x + 5$  या बहुपदीची किंमत  $x = 2$  असताना काढा.

$$\text{बहुपदी } p(x) = 2x^2 - 3x + 5$$

या बहुपदीमध्ये  $x = 2$  ठेवून,

$$\begin{aligned}\therefore p(2) &= 2 \times 2^2 - 3 \times 2 + 5 \\ &= 2 \times 4 - 6 + 5 \\ &= 8 - 6 + 5 \\ \therefore p(2) &= 7\end{aligned}$$

उदा (2)  $y = -2$  असताना बहुपदी  $p(y) = 2y^3 - 2y + \sqrt{7}$  ची किंमत काढा.

$$\text{उकल : } p(y) = 2y^3 - 2y + \sqrt{7}$$

$$\begin{aligned}\therefore p(-2) &= 2 \times (-2)^3 - 2 \times (-2) + \sqrt{7} \\ &= 2 \times (-8) - 2 \times (-2) + \sqrt{7} \\ &= -16 + 4 + \sqrt{7} \\ &= -12 + \sqrt{7}\end{aligned}$$

$\therefore y = -2$  असताना बहुपदीची किंमत  $-12 + \sqrt{7}$  आहे.

उदा (3)  $p(x) = 2x^2 - x^3 + x + 2$  या बहुपदीकरिता  $p(0)$  काढा.

$$\text{उकल : } p(x) = 2x^2 - x^3 + x + 2$$

$$\begin{aligned}\therefore p(0) &= 2 \times 0^2 - 0^3 + 0 + 2 \\ &= 2 \times 0 - 0 + 0 + 2 \\ &= 2\end{aligned}$$

उदा (4) जर  $m^2 - am + 7$  या बहुपदीची किंमत  $m = -1$  असताना 10 असेल, तर  $a$  ची किंमत काढा.

$$\text{उकल : } p(m) = m^2 - am + 7$$

$$\begin{aligned}\therefore p(-1) &= (-1)^2 - a \times (-1) + 7 \\ &= 1 + a + 7 \\ &= 8 + a\end{aligned}$$

परंतु  $p(-1) = 10$  (दिलेले आहे.)

$$\begin{aligned}\therefore 8 + a &= 10 \\ \therefore a &= 10 - 8 \\ \therefore a &= 2\end{aligned}$$

### सरावसंच 3.4

- (1)  $x = 0$  असताना  $x^2 - 5x + 5$  या बहुपदीची किंमत काढा.
- (2) जर  $p(y) = y^2 - 3\sqrt{2}y + 1$  तर  $p(3\sqrt{2})$  काढा.
- (3) जर  $p(m) = m^3 + 2m^2 - m + 10$  तर  $p(a) + p(-a) = ?$
- (4) जर  $p(y) = 2y^3 - 6y^2 - 5y + 7$  तर  $p(2)$  काढा.



हे लक्षात ठेवूया.

चलाच्या एखाद्या किमतीसाठी बहुपदीची किंमत काढताना प्रत्येक पदात  $x$  च्या जागी दिलेली किंमत भरून त्या राशीची किंमत काढायची असते.



जाणून घेऊया.

### शेष सिद्धांत (Remainder Theorem)

$p(x)$  या बहुपदीला  $(x + a)$  ने भागल्यास उरणारी बाकी आणि या बहुपदीत  $x$  ला  $-a$  ही किंमत देऊन येणारी त्या बहुपदीची किंमत यांचा परस्पर संबंध असतो. हा संबंध जाणण्यासाठी खालील उदाहरण अभ्यासा.

उदा.  $p(x) = (4x^2 - x + 2)$  ला  $(x + 1)$  ने भागा.

[येथे  $(x + a)$  म्हणजे  $(x + 1)$  आहे हे लक्षात ठेवूया.]

उकल : भाज्य बहुपदी =  $4x^2 - x + 2$

भाजक बहुपदी =  $x + 1$

$$\begin{array}{r}
 \text{भागाकार } 4x - 5 \\
 \text{भाजक } x + 1 \overline{) 4x^2 - x + 2} \quad \text{भाज्य} \\
 \underline{- 4x^2 + 4x} \phantom{+ 2} \\
 - 5x + 2 \\
 \underline{- -5x - 5} \\
 + \phantom{-} + \\
 \hline
 7 \text{ बाकी}
 \end{array}$$

भागाकार =  $4x - 5$  व बाकी =  $7 \dots (I)$

हेच उदाहरण संश्लेषक भागाकार पद्धतीने करू.

$p(x)$  चे सहगुणक रूप =  $(4, -1, 2)$

भाजक बहुपदी =  $x + 1$

1 ची विरुद्ध संख्या  $-1$

$$\begin{array}{r|rrr}
 -1 & 4 & -1 & 2 \\
 & & -4 & 5 \\
 \hline
 & 4 & -5 & \boxed{7} \text{ बाकी}
 \end{array}$$

भागाकार =  $4x - 5$  बाकी =  $7$

आता आपण बाकी आणि भाज्य बहुपदीची किंमत यांमधील संबंध बघू.

भाज्य बहुपदीची म्हणजे  $4x^2 - x + 2$  या बहुपदीची  $x = -1$  असताना किंमत काढू.

$$p(x) = 4x^2 - x + 2$$

$$\begin{aligned}\therefore p(-1) &= 4 \times (-1)^2 - (-1) + 2 \\ &= 4 \times 1 + 1 + 2 \\ &= 4 + 1 + 2 \\ &= 7\end{aligned}$$

$\therefore x = -1$  असताना बहुपदी  $p(x)$  ची किंमत 7 आहे. .... (II)

म्हणून विधान (I) व (II) वरून,  $p(x) = 4x^2 - x + 2$  या बहुपदीला  $(x + a)$  ने म्हणजेच येथे  $x + 1$  ने भागून मिळणारी बाकी आणि  $x = -1$  असताना  $p(x)$  या बहुपदीची किंमत म्हणजेच  $p(-1)$  समान आहेत.

यावरून पुढील गुणधर्म लक्षात येतो.

$p(x)$  या बहुपदीला  $(x + a)$  ने भागल्यास उरणारी बाकी ही  $p(-a)$  एवढी, म्हणजेच  $p(x)$  मध्ये  $x = -a$  मांडून येणाऱ्या बहुपदींच्या किमतीएवढी असते.

(‘शेष’ या शब्दाचा अर्थ ‘बाकी’ असा आहे.)

या गुणधर्माला शेष सिद्धांत म्हणतात.

युक्लिडचा भागाकाराचा नियम वापरून हा गुणधर्म सिद्ध करू.

$p(x)$  ला  $(x + a)$  ने भागल्यास

$$p(x) = q(x) \times (x + a) + r(x) \quad [q(x) = \text{भागाकार}, r(x) = \text{बाकी}]$$

जर,  $r(x) \neq 0$ , तर नियमाप्रमाणे  $r(x)$  ची कोटी 1 पेक्षा कमी म्हणजे 0 आहे. म्हणून  $r(x)$  ही वास्तव संख्या आहे.

$\therefore r(-a)$  ही सुद्धा वास्तव संख्या आहे.

$$\text{आता, } p(x) = q(x) \times (x + a) + r(x) \dots\dots\dots(1)$$

यामध्ये  $x = -a$  किंमत घेऊन

$$\begin{aligned}p(-a) &= q(-a) \times (a - a) + r(-a) \\ &= q(-a) \times 0 + r(-a) \dots\dots\dots(2)\end{aligned}$$

$$\therefore p(-a) = r(-a) \dots\dots\dots(1) \text{ आणि } (2) \text{ वरून}$$

**कृती :** खालील उदाहरणांचा पडताळा घ्या.

- (1)  $p(x) = 3x^2 + x + 7$  या बहुपदीस  $x + 2$  या बहुपदीने भागा आणि बाकी काढा.
- (2)  $x = -2$  असताना  $p(x) = 3x^2 + x + 7$  या बहुपदीची किंमत काढा.
- (3) आता भागाकारात मिळालेली बाकी ही  $p(-2)$  ची किंमत आहे का ?  
आणखी एक उदाहरण घेऊन वरीलप्रमाणे पडताळा घ्या.

**उदा (1)**  $x^4 - 5x^2 - 4x$  या बहुपदीस  $x + 3$  ने भागल्यास येणारी बाकी काढा.

**उकल :** शेष सिद्धांताने

भाज्य बहुपदी  $p(x) = x^4 - 5x^2 - 4x$

भाजक =  $x + 3$

$\therefore x = -3$  घेऊ.

$\therefore p(x) = x^4 - 5x^2 - 4x$

$p(-3) = (-3)^4 - 5(-3)^2 - 4(-3)$

$= 81 - 45 + 12$

$p(-3) = 48$

**संश्लेषक भागाकार पद्धतीने**

प्रमाण रूप  $x^4 + 0x^3 - 5x^2 - 4x + 0$

सहगुणक रूप =  $(1, 0, -5, -4, 0)$

- 3		1	0	-5	-4	0
			-3	9	-12	48
		1	-3	4	-16	48

बाकी = 48

**उदा (2)** शेष सिद्धांताचा उपयोग करून  $x^3 - 2x^2 - 4x - 1$  या बहुपदीस  $x - 1$  ने भागल्यास येणारी बाकी काढा.

**उकल :**  $p(x) = x^3 - 2x^2 - 4x - 1$

भाजक =  $x - 1$   $\therefore x = 1$  घेऊ.

$\therefore$  शेष सिद्धांतानुसार बाकी =  $p(1) = 1^3 - 2 \times 1^2 - 4 \times 1 - 1$

$= 1 - 2 \times 1 - 4 - 1$

$p(1) = 1 - 2 - 4 - 1 = -6$

$\therefore$  शेषसिद्धांतानुसार बाकी =  $-6$

**उदा (3)** जर  $t^3 - 3t^2 + kt + 50$  या बहुपदीस  $(t-3)$  ने भागल्यावर बाकी 62 उरत असेल, तर  $k$  ची किंमत काढा.

**उकल :** दिलेल्या बहुपदीला  $(t-3)$  ने भागल्यावर बाकी 62 उरते हे दिले आहे. म्हणून दिलेल्या भाज्य बहुपदीची किंमत  $t = 3$  असताना काढू.

$p(t) = t^3 - 3t^2 + kt + 50$

∴ शेष सिद्धांतानुसार

$$\begin{aligned} \text{बाकी} &= p(3) = 3^3 - 3 \times 3^2 + k \times 3 + 50 & \therefore 3k + 50 &= 62 \\ &= 27 - 3 \times 9 + 3k + 50 & \therefore 3k &= 62 - 50 \\ &= 27 - 27 + 3k + 50 & \therefore 3k &= 12 \\ &= 3k + 50 & \therefore k &= \frac{12}{3} \\ \text{परंतु बाकी 62 दिली आहे.} & & \therefore k &= 4 \end{aligned}$$



हे लक्षात ठेवूया.

शेष सिद्धांत :  $p(x)$  ही कोणतीही बहुपदी असून 'a' ही वास्तव संख्या असेल आणि जर  $p(x)$  ला  $(x + a)$  ने भागले तर येणारी बाकी ही  $p(-a)$  एवढी असते.

$$p(x) = s(x)(x - a) + r(x) \quad r(x) \text{ ची कोटी} < 1 \text{ किंवा } r(x) = 0$$

या समीकरणात  $x = a$  घालून  $p(a) = 0 + r(a) = r(a)$  मिळते.

∴  $r(a)$  ची कोटी = 0 किंवा  $r(a) = 0$  म्हणजेच  $(x - a)$  हा  $p(x)$  चा अवयव आहे असे लक्षात येते.



जाणून घेऊया.

### अवयव सिद्धांत (Factor Theorem)

जर 21 ला 7 ने भागले तर बाकी 0 येते. म्हणून आपण 7 हा 21 चा अवयव आहे असे म्हणतो.

त्याचप्रमाणे दिलेल्या बहुपदीला भाजक बहुपदीने भागल्यास बाकी 0 आली तर ती बहुपदी दिलेल्या बहुपदीचा अवयव आहे असे म्हणतात.

उदा (1)  $p(x) = (x^3 + 4x - 5)$  या बहुपदीस  $(x - 1)$  ने भागल्यास येणारी बाकी काढा.  
 $(x - 1)$  हा  $p(x)$ चा अवयव आहे का हे ठरवा.

$$\begin{aligned} \text{उकल : } p(x) &= x^3 + 4x - 5 \\ p(1) &= (1)^3 + 4(1) - 5 \\ &= 1 + 4 - 5 \\ &= 0 \end{aligned}$$

येथे, शेष सिद्धांतानुसार बाकी = 0

∴  $(x - 1)$  हा  $p(x)$  या बहुपदीचा अवयव आहे.

उदा (2)  $p(x) = x^3 + 4x - 5$  या बहुपदीला  $x + 2$  ने भागल्यास येणारी बाकी काढा.  
 $(x + 2)$  हा  $p(x)$ चा अवयव आहे का हे ठरवा.

$$\begin{aligned} \text{उकल : } p(x) &= x^3 + 4x - 5 \\ p(-2) &= (-2)^3 + 4(-2) - 5 \\ p(-2) &= -8 - 8 - 5 \\ &= -21 \end{aligned}$$

शेष सिद्धांतानुसार बाकी = -21 आली.

येथे बाकी  $\neq 0$

∴  $(x + 2)$  हा  $p(x)$  या बहुपदीचा अवयव नाही.

कृती :  $(x - 1)$  हा  $x^3 + 4x - 5$  या बहुपदीचा अवयव आहे का हे पडताळा.





### हे लक्षात ठेवूया.

$p(x)$  ही बहुपदी असून  $a$  ही कोणतीही वास्तव संख्या असेल आणि जर  $p(a) = 0$  असेल तर  $(x - a)$  हा  $p(x)$  चा अवयव असतो.

याउलट  $(x - a)$  हा  $p(x)$  या बहुपदीचा अवयव असेल तर  $p(a) = 0$  असते.

**उदा (1)** अवयव सिद्धांताचा उपयोग करून,  $x - 2$  हा  $x^3 - x^2 - 4$  या बहुपदीचा अवयव आहे का ते ठरवा.

**उकल :**  $p(x) = x^3 - x^2 - 4$  भाजक =  $x - 2$

$$\therefore p(2) = 2^3 - 2^2 - 4 = 8 - 4 - 4 = 0$$

$\therefore$  अवयव सिद्धांतानुसार,  $(x - 2)$  हा  $(x^3 - x^2 - 4)$  या बहुपदीचा अवयव आहे.

**उदा (2)** जर  $(x - 1)$  हा  $(x^3 - 2x^2 + mx - 4)$  चा अवयव असेल तर  $m$  ची किंमत काढा.

**उकल :**  $(x - 1)$  हा  $p(x)$  चा अवयव आहे.  $\therefore p(1) = 0$

$$p(x) = x^3 - 2x^2 + mx - 4$$

$$p(1) = 1^3 - 2 \times 1^2 + m \times 1 - 4 = 0$$

$$\therefore 1 - 2 \times 1 + m - 4 = 0$$

$$\therefore 1 - 2 + m - 4 = 0 \quad \therefore m - 5 = 0$$

$$\therefore m = 5$$

**कृती :** आपण कोरडवाहू शेती करणाऱ्या गोविंदच्या शेतीच्या संदर्भात बहुपदींच्या रूपात शेतीचा खर्च व उत्पन्न या बाबी पाहिल्या होत्या. त्याने बँकेचे कर्ज सव्वा लाख रुपये घेतले व ते 10% व्याजदराने परत केले होते. बियाणांसाठी खर्च 10,000 रुपये, सोयाबीनच्या पिकासाठी खते-कीटकनाशकांसाठी  $2000x$  रुपये व त्याच्या मशागतीसाठी  $4000x^2$  रुपये खर्च आला होता. कापूस व तूर या पिकांसाठी खते-कीटकनाशकांसाठी  $8000y$  रुपये व मशागतीसाठी  $9000y^2$  रुपये एवढा खर्च केला होता.

एकूण उत्पन्न  $14000x^2 + \frac{25000}{3}y^2 + 16000y$  एवढे झाले.

$x = 2, y = 3$  या किमती घेऊन गोविंदच्या शेतीचा जमाखर्च लिहून काढा.

उकल :	जमा	खर्च
	1,25,000 रुपये बँकेचे कर्ज	1,37,000 रुपये बँकेची व्याजासह परतफेड.
₹	<input type="text"/> सोयाबीनचे उत्पन्न	₹ <input type="text"/> बियाणांसाठी
₹	<input type="text"/> कापसाचे उत्पन्न	₹ <input type="text"/> सोयाबीन:खते व कीटकनाशके
₹	<input type="text"/> तुरीचे उत्पन्न	₹ <input type="text"/> सोयाबीन: मजुरी व मशागत
₹	<input type="text"/> एकूण जमा	₹ <input type="text"/> कापूस व तूर : खते व कीटकनाशके
		₹ <input type="text"/> कापूस व तूर : मजुरी व मशागत
		₹ <input type="text"/> एकूण खर्च

सरावसंच 3.5

- (1)  $x$  ची दिलेली किंमत घेऊन  $2x - 2x^3 + 7$  या बहुपदीची किंमत काढा.  
 (i)  $x = 3$  (ii)  $x = -1$  (iii)  $x = 0$
- (2) खालील प्रत्येक बहुपदीकरिता  $p(1)$ ,  $p(0)$  आणि  $p(-2)$  काढा.  
 (i)  $p(x) = x^3$  (ii)  $p(y) = y^2 - 2y + 5$  (iii)  $p(x) = x^4 - 2x^2 - x$
- (3) जर  $m^3 + 2m + a$  या बहुपदीची किंमत  $m = 2$  असताना 12 आहे, तर  $a$  ची किंमत काढा.
- (4) जर  $mx^2 - 2x + 3$  या बहुपदीकरिता  $p(-1) = 7$  असेल तर  $m$  ची किंमत काढा.
- (5) खालीलपैकी पहिल्या बहुपदीला दुसऱ्या बहुपदीने भागल्यास, येणारी बाकी शेष सिद्धांताचा उपयोग करून काढा.  
 (i)  $(x^2 - 7x + 9)$  ;  $(x + 1)$   
 (ii)  $(2x^3 - 2x^2 + ax - a)$  ;  $(x - a)$   
 (iii)  $(54m^3 + 18m^2 - 27m + 5)$  ;  $(m - 3)$
- (6)  $y^3 - 5y^2 + 7y + m$  या बहुपदीस  $y + 2$  ने भागल्यास बाकी 50 उरते, तर  $m$  ची किंमत काढा.
- (7) अवयव सिद्धांताचा उपयोग करून,  $x + 3$  हा  $x^2 + 2x - 3$  चा अवयव आहे का ते ठरवा.
- (8) जर  $x - 2$  हा  $x^3 - mx^2 + 10x - 20$  या बहुपदीचा अवयव असेल तर  $m$  ची किंमत काढा.
- (9) खालील उदाहरणात  $q(x)$  हा  $p(x)$  चा अवयव आहे किंवा नाही हे अवयव सिद्धांताने ठरवा.  
 (i)  $p(x) = x^3 - x^2 - x - 1$ ,  $q(x) = x - 1$   
 (ii)  $p(x) = 2x^3 - x^2 - 45$ ,  $q(x) = x - 3$
- (10)  $(x + 1)$  ने  $(x^{31} + 31)$  ला भागल्यास येणारी बाकी काढा.
- (11)  $m - 1$  हा  $m^{21} - 1$  व  $m^{22} - 1$  या बहुपदींचा अवयव आहे हे दाखवा.
- (12\*) जर  $x - 2$  आणि  $x - \frac{1}{2}$  हे दोन्ही  $nx^2 - 5x + m$  या बहुपदीचे अवयव असतील तर दाखवा की  $m = n = 2$
- (13) (i) जर  $p(x) = 2 + 5x$  तर  $p(2) + p(-2) - p(1)$  काढा.  
 (ii) जर  $p(x) = 2x^2 - 5\sqrt{3}x + 5$  तर  $p(5\sqrt{3})$  काढा.



जरा आठवूया.

मागील इयत्तेत आपण बहुपदींचे अवयव कसे काढावे याचा अभ्यास केला आहे. काही उदाहरणे पाहू. अवयव काढा.

उदा (1)  $4x^2 - 25$   
 $= (2x)^2 - (5)^2$   
 $= (2x + 5)(2x - 5)$

उदा (2)  $3x^2 + 7x + 2$   
 $= \underline{3x^2 + 6x} + \underline{x + 2}$   
 $= 3x(x + 2) + 1(x + 2)$   
 $= (x + 2)(3x + 1)$

$$\begin{aligned}
\text{उदा (3)} \quad & 63x^2 + 5x - 2 \\
& = 63x^2 + 14x - 9x - 2 \\
& = 7x(9x + 2) - 1(9x + 2) \\
& = (9x + 2)(7x - 1)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{उदा (4)} \quad & 6x^2 - 5x - 6 \\
& = 6x^2 - 9x + 4x - 6 \\
& = 3x(2x - 3) + 2(2x - 3) \\
& = (2x - 3)(3x + 2)
\end{aligned}$$



जाणून घेऊया.

### बहुपदींचे अवयव (Factors of polynomials)

काही वेळा दिलेल्या बहुपदीचे रूपांतर  $ax^2 + bx + c$  असे करता येते. त्यामुळे तिचे अवयव शोधणे सोपे जाते.

उदा (1)  $(y^2 - 3y)^2 - 5(y^2 - 3y) - 50$  चे अवयव काढा.

उकल : दिलेल्या बहुपदीत  $(y^2 - 3y) = x$  मानू.

$$\begin{aligned}
\therefore (y^2 - 3y)^2 - 5(y^2 - 3y) - 50 & = x^2 - 5x - 50 \\
& = x^2 - 10x + 5x - 50 \\
& = x(x - 10) + 5(x - 10) \\
& = (x - 10)(x + 5) \\
& = (y^2 - 3y - 10)(y^2 - 3y + 5) \\
& = [y^2 - 5y + 2y - 10](y^2 - 3y + 5) \\
& = [y(y - 5) + 2(y - 5)](y^2 - 3y + 5) \\
& = (y - 5)(y + 2)(y^2 - 3y + 5)
\end{aligned}$$

उदा (2) अवयव पाडा.

$$(x + 2)(x - 3)(x - 7)(x - 2) + 64$$

उकल :  $(x + 2)(x - 3)(x - 7)(x - 2) + 64$

$$\begin{aligned}
& = (x + 2)(x - 7)(x - 3)(x - 2) + 64 \\
& = (x^2 - 5x - 14)(x^2 - 5x + 6) + 64 \\
& = (m - 14)(m + 6) + 64 \dots \dots \dots (x^2 - 5x \text{ साठी } m \text{ मानून.}) \\
& = m^2 - 14m + 6m - 84 + 64 \\
& = m^2 - 8m - 20 \\
& = (m - 10)(m + 2) \\
& = (x^2 - 5x - 10)(x^2 - 5x + 2) \dots \dots m \text{ च्या जागी } x^2 - 5x \text{ लिहून}
\end{aligned}$$

### सरावसंच 3.6

(1) खालील बहुपदींचे अवयव काढा.

- |                      |                                   |                                |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| (i) $2x^2 + x - 1$   | (ii) $2m^2 + 5m - 3$              | (iii) $12x^2 + 61x + 77$       |
| (iv) $3y^2 - 2y - 1$ | (v) $\sqrt{3}x^2 + 4x + \sqrt{3}$ | (vi) $\frac{1}{2}x^2 - 3x + 4$ |

(2) खालील बहुपदींचे अवयव काढा.

(i)  $(x^2 - x)^2 - 8(x^2 - x) + 12$

(ii)  $(x - 5)^2 - (5x - 25) - 24$

(iii)  $(x^2 - 6x)^2 - 8(x^2 - 6x + 8) - 64$  (iv)  $(x^2 - 2x + 3)(x^2 - 2x + 5) - 35$

(v)  $(y + 2)(y - 3)(y + 8)(y + 3) + 56$

(vi)  $(y^2 + 5y)(y^2 + 5y - 2) - 24$

(vii)  $(x - 3)(x - 4)^2(x - 5) - 6$

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3

(1) खालील प्रत्येक प्रश्नासाठी दिलेल्या पर्यायांपैकी अचूक पर्याय निवडा.

(i) खालीलपैकी बहुपदी कोणती ?

(A)  $\frac{x}{y}$  (B)  $x^{\sqrt{2}} - 3x$  (C)  $x^{-2} + 7$  (D)  $\sqrt{2}x^2 + \frac{1}{2}$

(ii)  $\sqrt{7}$  या बहुपदीची कोटी किती ?

(A)  $\frac{1}{2}$  (B) 5 (C) 2 (D) 0

(iii) 0 बहुपदीची कोटी किती असते ?

(A) 0 (B) 1 (C) निश्चित करता येत नाही (D) कोणतीही वास्तव संख्या

(iv)  $2x^2 + 5x^3 + 7$  या बहुपदीची कोटी किती ?

(A) 3 (B) 2 (C) 5 (D) 7

(v)  $x^3 - 1$  या बहुपदीचे सहगुणक रूप कोणते ?

(A) (1, -1) (B) (3, -1) (C) (1, 0, 0, -1) (D) (1, 3, -1)

(vi)  $p(x) = x^2 - 7\sqrt{7}x + 3$  तर  $p(7\sqrt{7}) = ?$

(A) 3 (B)  $7\sqrt{7}$  (C)  $42\sqrt{7} + 3$  (D)  $49\sqrt{7}$

(vii)  $2x^3 + 2x$  या बहुपदीची  $x = -1$  असताना किंमत किती ?

(A) 4 (B) 2 (C) -2 (D) -4

(viii)  $3x^2 + mx$  या बहुपदीचा  $x = -1$  हा अवयव असेल तर  $m$  ची किंमत किती ?

(A) 2 (B) -2 (C) -3 (D) 3

(ix)  $(x^2 - 3)(2x - 7x^3 + 4)$  हा गुणाकार करून मिळणाऱ्या बहुपदीची कोटी किती ?

(A) 5 (B) 3 (C) 2 (D) 0

(x) खालीलपैकी रेषीय बहुपदी कोणती ?

(A)  $x + 5$  (B)  $x^2 + 5$  (C)  $x^3 + 5$  (D)  $x^4 + 5$

(2) खालील प्रत्येक बहुपदीची कोटी लिहा.

(i)  $5 + 3x^4$  (ii) 7 (iii)  $ax^7 + bx^9$  { $a, b$  या स्थिर संख्या आहेत.}

(3) खालील बहुपदी प्रमाण रूपात लिहा.

(i)  $4x^2 + 7x^4 - x^3 - x + 9$  (ii)  $p + 2p^3 + 10p^2 + 5p^4 - 8$

(4) खालील बहुपदी सहगुणक रूपात लिहा.

(i)  $x^4 + 16$  (ii)  $m^5 + 2m^2 + 3m + 15$

(5) खालील सहगुणक रूपातील बहुपदी  $x$  हे चल वापरून घातांक रूपात लिहा.

(i) (3, -2, 0, 7, 18) (ii) (6, 1, 0, 7) (iii) (4, 5, -3, 0)

(6) बेरीज करा.

(i)  $7x^4 - 2x^3 + x + 10$  ;  $3x^4 + 15x^3 + 9x^2 - 8x + 2$  (ii)  $3p^3q + 2p^2q + 7$  ;  $2p^2q + 4pq - 2p^3q$

(7) वजाबाकी करा.

(i)  $5x^2 - 2y + 9$  ;  $3x^2 + 5y - 7$  (ii)  $2x^2 + 3x + 5$  ;  $x^2 - 2x + 3$

(8) खालील गुणाकार करा.

(i)  $(m^3 - 2m + 3)(m^4 - 2m^2 + 3m + 2)$  (ii)  $(5m^3 - 2)(m^2 - m + 3)$

(9)  $3x^3 - 8x^2 + x + 7$  या बहुपदीला  $x - 3$  या बहुपदीने संश्लेषक पद्धतीने भागा व बाकी काढा.

(10)  $m$  च्या कोणत्या किमतीकरिता  $x + 3$  हा  $x^3 - 2mx + 21$  या बहुपदीचा अवयव असेल ?

(11) 2016 वर्षाच्या शेवटी कोवाड, वरूड व चिखली गावांची लोकसंख्या अनुक्रमे  $5x^2 - 3y^2$ ,  $7y^2 + 2xy$  आणि  $9x^2 + 4xy$  होती. 2017 वर्षाच्या सुरुवातीला तीनही गावांतून शिक्षण व रोजगाराकरिता अनुक्रमे  $x^2 + xy - y^2$ ,  $5xy$  व  $3x^2 + xy$  माणसे दुसऱ्या गावी गेली. तर 2017 च्या सुरुवातीला त्या गावांची एकूण लोकसंख्या किती होती ?

(12)  $bx^2 + x + 5$  व  $bx^3 - 2x + 5$  या बहुपदींना  $x - 3$  ने भागल्यास येणारी बाकी अनुक्रमे  $m$  व  $n$  असेल आणि जर  $m - n = 0$  असेल तर  $b$  ची किंमत काढा.

(13) सरळरूप द्या.  $(8m^2 + 3m - 6) - (9m - 7) + (3m^2 - 2m + 4)$

(14)  $x^2 + 13x + 7$  मधून कोणती बहुपदी वजा करावी म्हणजे  $3x^2 + 5x - 4$  ही बहुपदी मिळेल ?

(15)  $4m + 2n + 3$  या राशीत कोणती राशी मिळवावी म्हणजे  $6m + 3n + 10$  ही बहुपदी मिळेल ?

