



مثلث Triangle


3

آئیے، سیکھیں



- مثلث کے بعید داخلہ زاویوں کا مسئلہ
- مثلث کی متماثلت
- متساوی الساقین مثلث کا مسئلہ
- $30^\circ-60^\circ-90^\circ$ پیمائش کے مثلث کی خصوصیت
- مثلث کا وسطانیہ
- قائمہ الزاویہ مثلث کے وتر پر کھینچے گئے وسطانیہ کی خصوصیت
- عمودی ناصف کا مسئلہ
- زاویے کے ناصف کا مسئلہ
- متشابه مثلث

عملی کام : ایک موٹی دفنی پر کسی بھی پیمائش کا $\triangle PQR$ بنائیے۔ شکل کے مطابق شعاع QR پر نقطہ T لیجیے۔ رنگین موٹے کارڈ شیٹ کے $\angle P$ اور $\angle Q$ کی پیمائش کے ٹکڑے کاٹ لیجیے۔ ان ٹکڑوں کو $\angle PRT$ میں رکھ کر دیکھیے۔ وہ مکمل طور پر سما جاتا ہے۔



شکل 3.1

آئیے سمجھ لیں




مثلث کے بعید داخلہ زاویوں کا مسئلہ (Theorem of Remote Interior angles of a Triangle)

مسئلہ : مثلث کے ایک خارجہ زاویہ کی پیمائش، اس کے بعید داخلہ زاویوں کی پیمائشوں کے مجموعے کے مساوی ہوتی ہے۔

دیا ہوا ہے : $\triangle PQR$ کا، $\angle PRS$ کا خارجہ زاویہ ہے۔

ثابت کرنا ہے : $\angle PRS = \angle PQR + \angle QPR$

ثبوت : مثلث کے تینوں زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ 180° ہوتا ہے۔



شکل 3.2

$$\therefore \angle PQR + \angle QPR + \angle PRQ = 180^\circ \quad \dots (I)$$

$$\angle PRQ + \angle PRS = 180^\circ \quad \dots (II) \quad (\text{خطی جوڑی کے زاویے})$$

اس لیے بیان (I) اور (II) کی بناء پر

$$\angle PQR + \angle QPR + \angle PRQ = \angle PRQ + \angle PRS$$

$$\therefore \angle PQR + \angle QPR = \angle PRS \quad \dots (\angle PRQ \text{ کا اخراج کرنے سے})$$

لہذا مثلث کے ایک خارجہ زاویہ کی پیمائش، اس کے بعید داخلہ زاویوں کی پیمائشوں کے مجموعے کے مساوی ہوتی ہے۔



شکل 3.2 میں نقطہ R سے قطعہ PQ کے متوازی خط کھینچ کر کیا اس مسئلہ کا کوئی دوسرا ثبوت دے سکتے ہیں؟




مثلث کے خارجہ زاویہ کی خصوصیت (Property of an Exterior angle of a Triangle)

a اور b ان دو اعداد کا مجموعہ (a + b)، عدد a سے بڑا اور b سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ یعنی $a + b > a$ ، $a + b > b$

اس کا استعمال کر کے مثلث کے خارجہ زاویہ کی درج ذیل خصوصیت حاصل ہوتی ہے۔

$\triangle PQR$ کا، $\angle PRS$ خارجہ زاویہ ہو تو $\angle PRS > \angle P$ ، $\angle PRS > \angle Q$

∴ مثلث کا خارجہ زاویہ، اس کے ہر بعید داخلہ زاویہ سے بڑا ہوتا ہے۔



شکل 3.3

حل کردہ مثالیں :

مثال (1) : ایک مثلث کے زاویوں کی پیمائشوں کی نسبت 5 : 6 : 7 ہے۔ تو اس کے تمام زاویوں کی پیمائشیں معلوم کیجیے۔

حل : فرض کیجیے مثلث کے زاویوں کی پیمائشیں $5x$ ، $6x$ اور $7x$ ہیں۔

$$5x + 6x + 7x = 180^\circ$$

$$18x = 180^\circ$$

$$x = 10^\circ$$

$$5x = 5 \times 10 = 50^\circ, \quad 6x = 6 \times 10 = 60^\circ, \quad 7x = 7 \times 10 = 70^\circ$$

مثلث کے زاویوں کی پیمائشیں بالترتیب 50° ، 60° اور 70° ہیں۔

مثال (2) : بازو کی شکل 3.4 کا مشاہدہ کر کے $\angle PRS$ اور $\angle RTS$ کی پیمائشیں معلوم کیجیے۔

حل : $\triangle PQR$ کا خارجہ زاویہ $\angle PRS$ ہے۔

بعید داخلہ زاویوں کے مسئلہ کی روش سے،

$$\angle PRS = \angle PQR + \angle QPR$$

$$= 40^\circ + 30^\circ$$

$$\angle PRS = 70^\circ$$


اب $\triangle RTS$ میں

$$\angle TRS + \angle RTS + \angle TSR = \boxed{} \dots (\text{مثلث کے تینوں زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ})$$


$$\therefore \boxed{} + \angle RTS + \boxed{} = 180^\circ$$

$$\therefore \angle RTS + 90^\circ = 180^\circ$$

$$\therefore \angle RTS = \boxed{}$$



شکل 3.4



شکل 3.7

مثال (4) : شکل 3.7 میں $\triangle ABC$ کے، $\angle B$ اور $\angle C$ کے ناصف

اگر نقطہ P پر قطع کرتے ہوں تو

$$\angle BPC = 90 + \frac{1}{2} \angle BAC$$

ثابت کیجیے کہ

خالی جگہ پر کر کے ثبوت مکمل کیجیے۔

ثبوت : $\triangle ABC$ میں،

$$\angle BAC + \angle ABC + \angle ACB = \square$$

(مثلث کے زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ) ..

$$\therefore \frac{1}{2} \angle BAC + \frac{1}{2} \angle ABC + \frac{1}{2} \angle ACB = \frac{1}{2} \times \square$$

(طرفین کو $\frac{1}{2}$ سے ضرب کرنے پر) ...

$$\therefore \frac{1}{2} \angle BAC + \angle PBC + \angle PCB = 90^\circ$$

$$\therefore \angle PBC + \angle PCB = 90^\circ - \frac{1}{2} \angle BAC \quad \dots (I)$$

میں $\triangle BPC$

$$\angle BPC + \angle PBC + \angle PCB = 180^\circ$$

(مثلث کے داخلہ زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ) ...

$$\therefore \angle BPC + \square = 180^\circ$$


[بیان (I) کی بناء پر] ...

$$\therefore \angle BPC = 180^\circ - (90^\circ - \frac{1}{2} \angle BAC)$$

$$\therefore = 180^\circ - 90^\circ + \frac{1}{2} \angle BAC$$

$$= 90^\circ + \frac{1}{2} \angle BAC$$

مشقی سیٹ 3.1



شکل 3.8


1. شکل 3.8 میں $\triangle ABC$ کا خارجہ زاویہ ہے۔ $\angle B = 40^\circ$ ،

$\angle A = 70^\circ$ ہو تو $m\angle ACD$ کی پیمائش معلوم کیجیے۔

2. $\triangle PQR$ میں، $\angle P = 70^\circ$ ، $\angle Q = 65^\circ$ ہو تو $\angle R$ کی پیمائش معلوم کیجیے۔


3. مثلث کے زاویوں کی پیمائشیں x° ، $(x-20)^\circ$ اور $(x-40)^\circ$ ہو تو ہر زاویے کی پیمائش معلوم کیجیے۔

4. مثلث کے تین زاویوں میں سے، ایک زاویہ، سب سے چھوٹے زاویہ کا دگنا اور دوسرا زاویہ، سب سے چھوٹے زاویہ کا تین گنا ہے۔ تو ان تینوں زاویوں کی پیمائش معلوم کیجیے۔



شکل 3.9

5. شکل 3.9 میں دیے ہوئے زاویوں کی پیمائشوں کی بنا پر x ، y اور z کی قیمتیں معلوم کیجیے۔




شکل 3.10

6. شکل 3.10 میں $DE \parallel AB$ خط، دی ہوئی پیمائشوں کی بنا پر $\angle DRE$ اور

$\angle ARE$ کی پیمائشیں معلوم کیجیے۔

7. $\triangle ABC$ میں $\angle A$ اور $\angle B$ کے ناصف، نقطہ O پر قطع کرتے ہیں اگر $\angle C = 70^\circ$ ہو تو $\angle AOB$ کی پیمائش معلوم کیجیے۔




شکل 3.11

8. شکل 3.11 میں $AB \parallel CD$ خط اور خط PQ ان کا تقاطع ہے۔ شعاع PT اور شعاع

QT بالترتیب $\angle BPQ$ اور $\angle PQD$ کی ناصف ہیں۔


تو ثابت کیجیے کہ $\angle PTQ = 90^\circ$



شکل 3.12

9. شکل 3.12 میں دی ہوئی معلومات کی مدد سے $\angle a$ ، $\angle b$ اور $\angle c$ کی پیمائشیں معلوم

کیجیے۔



شکل 3.13

10*. شکل 3.13 میں، $DE \parallel GF$ ضلع، شعاع EG اور شعاع FG

بالترتیب $\angle DFM$ اور $\angle DEF$ کی ناصف ہیں تو


ثابت کیجیے (i) $\angle DEF = \angle EDF$

(ii) $EF = FG$



مشائوں کی متماثلت (Congruence of Triangles)

ایک قطعہ خط دوسرے پر رکھنے پر منطبق ہوتا ہو تب وہ دو قطعہ متماثل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک زاویہ کو اٹھا کر دوسرے زاویے پر رکھنے پر منطبق ہوتے ہوں تو وہ دو زاویے متماثل ہوتے ہیں۔ اس بات کو ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح ایک مثلث کو اٹھا کر دوسرے مثلث پر رکھنے پر منطبق ہوتے ہیں تو وہ دو مثلث متماثل ہوتے ہیں۔ اگر $\triangle ABC$ اور $\triangle PQR$ متماثل ہوں تب اسے $\triangle ABC \cong \triangle PQR$ کی صورت میں دکھایا جاتا ہے۔



شکل 3.14

عملی کام :

کسی بھی پیمائش کا ایک مثلث $\triangle ABC$ موٹی دفنی سے کاٹ لیجیے۔ اسے کارڈ شیٹ پر ایک جگہ رکھ کر اس کے اطراف سے پنسل گھما کر اس کی نقل بنائیے۔ اس مثلث کو $\triangle A_1B_1C_1$ نام دیجیے۔

اب اس دفنی کے مثلث کو ہٹا کر دوسرے جانب سرکا کر وہاں دوسری نقل بنائیے۔ اسے $\triangle A_2B_2C_2$ نام دیجیے۔ اس کے بعد اوپر کی شکل کے مطابق اس مثلث کو تھوڑا گھما کر ایک اور نقل بنائیے۔ اس نقل کو $\triangle A_3B_3C_3$ نام دیجیے۔ بعد میں مثلث نمادنی کو اٹھا کر دوسری جانب اوندھا رکھ کر اسی کی نقل بنائیے اور نئے مثلث کو $\triangle A_4B_4C_4$ نام دیجیے۔

کیا آپ کے دھیان میں آگیا؟ یہ سب $\triangle ABC$ کے متماثل ہیں کیونکہ $\triangle ABC$ ہر ایک پر منطبق ہو جاتا ہے۔ $\triangle A_3B_3C_3$ کے لیے تصدیق کیجیے۔ لیکن اسے $\angle A$ کو $\angle A_3$ ، $\angle B$ کو $\angle B_3$ اور $\angle C$ کو $\angle C_3$ پر رکھنے پر $\triangle ABC \cong \triangle A_3B_3C_3$ کہہ سکتے ہیں۔ پھر $AB = A_3B_3$ ، $BC = B_3C_3$ اور $CA = C_3A_3$ بھی منطبق ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دو مثلثوں کی متماثلت کی جانچ کے دوران ان کے زاویے اور ضلع مخصوص ترتیب سے یعنی ایک سے ایک مطابقت رکھتے ہیں۔


اگر $\triangle ABC \cong \triangle PQR$ ہو تو $\angle A = \angle P$ ، $\angle B = \angle Q$ اور $\angle C = \angle R$... (I)

اور $CA = RP$ ، $BC = QR$ ، $AB = PQ$... (II) اس طرح کل چھ مساواتیں حاصل ہوتی ہیں۔

یعنی ان مثلثوں کے زاویوں اور ضلعوں کی ایک سے ایک مطابقت کی وجہ سے ان کے تین زاویے مساوی اور تین ضلعے مساوی ہیں۔

اوپر کے تمام چھ مساواتیں متماثل مثلث کے لیے صحیح ہیں۔ اس لیے تین مخصوص مساواتیں مساوی معلوم ہونے پر تمام چھ مساواتیں صحیح ہو جاتی ہیں اور وہ دونوں مثلث متماثل ہوتے ہیں۔ وہ کیسے آئیے دیکھتے ہیں۔


(1) جب ایک سے ایک مطابقت کے لحاظ سے $\triangle ABC$ کے دوزاویے، $\triangle PQR$ کے دوزاویوں کے مساوی ہوں اور ان زاویوں کا مشمولی ضلع مساوی ہوں تو وہ دو مثلث متماثل ہوتے ہیں۔



شکل 3.15

اس خصوصیت کو 'زاویہ-ضلع-زاویہ' آزمائش کہتے ہیں۔
اسے مختصراً زاہل زا آزمائش لکھتے ہیں۔


(2) جب ایک سے ایک مطابقت کے لحاظ سے $\triangle ABC$ کے دواضلاع $\triangle PQR$ کے دواضلاع کے مساوی ہوں اور $\triangle ABC$ کے ان دواضلاع کے درمیان کا زاویہ $\triangle PQR$ کے دو نظیری اضلاع کے درمیان کے زاویہ کے مساوی ہوں تو وہ دو مثلث متماثل ہوتے ہیں۔



شکل 3.16

اس خصوصیت کو 'ضلع - زاویہ - ضلع' آزمائش کہتے ہیں۔
اور اسے مختصراً ضل ز اضل آزمائش لکھتے ہیں۔

(3) جب $\triangle ABC$ کے تین اضلاع ایک سے ایک مطابقت کے لحاظ سے $\triangle PQR$ کے نظیری اضلاع کے مساوی ہوں تو وہ مثلث متماثل ہوتے ہیں۔




شکل 3.17

اس خصوصیت کو 'ضلع-ضلع-ضلع' آزمائش کہتے ہیں۔
اور اسے مختصراً ضل ضل ضل آزمائش لکھتے ہیں۔

(4) $\triangle ABC$ اور $\triangle PQR$ دونوں قائمہ الزاویہ مثلث ہیں۔ ان مثلثوں میں $\angle B$ اور $\angle Q$ قائمہ زاویے ہیں اور دونوں مثلثوں کے وتر مساوی

ہیں۔ نیز $AB = PQ$ ہو تو وہ مثلث متماثل ہوتے ہیں۔



شکل 3.18

اس آزمائش کو وتر ضلع آزمائش کہتے ہیں۔







ہم نے مثلث کی کچھ پیمائشیں دی ہوں تو مثلث بنایا ہے۔ (مثلاً دو زاویہ اور ان کا مشمولی ضلع، تین ضلع، دو اضلاع اور ان کا مشمولی زاویہ) ان میں سے کوئی بھی معلومات دی جائے تو ایک ہی مثلث بنا سکتے ہیں، اس بات کا ہمیں تجربہ ہے۔ اس لیے دو مثلثوں میں ایک سے ایک مطابقت کے لحاظ سے یہ تین ارکان دیے ہوئے ہوں تو دونوں مثلث متماثل ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ پھر ایک سے ایک مطابقت کے لحاظ سے ان کے تینوں زاویے مساوی اور تینوں ضلع بھی مساوی ہوتے ہیں۔

دو مثلث متماثل ہوں تو ایک سے ایک مطابقت کے لحاظ سے ان کے تینوں زاویے متماثل ہوتے ہیں۔ اور تینوں اضلاع مساوی ہوتے ہیں۔ اس کا استعمال علم ہندسہ کی کئی مثالوں میں ہوتا ہے۔

مشقی سیٹ 3.2


1. ذیل کے مثالوں میں مثلث کی جوڑیوں کے ارکان کو یکساں نشانات سے دکھائے ہوئے حصے متماثل ہیں اس معلومات کی مدد سے ہر جوڑی کے مثلث جس آزمائش کی بنا پر متماثل ہوتے ہیں وہ آزمائش شکل کے نیچے دی ہوئی خالی جگہ میں لکھیے۔



شکل 3.19

2. ذیل کے مثلثوں کی جوڑیوں میں ظاہر کی گئی معلومات کا مشاہدہ کیجیے۔ وہ مثلث کس آزمائش کے لحاظ سے متماثل ہیں۔ اسے لکھیے اور ان کے بقیہ متماثل ارکان بھی لکھیے۔

(ii)



شکل 3.21

شکل میں دی ہوئی معلومات کے مطابق،
 $\triangle PTQ \cong \triangle STR$ میں،

قطعہ $PT \cong$ قطعہ ST

$\angle PTQ \cong \angle STR$... (مقابلہ زاویے)

قطعہ $TQ \cong$ قطعہ TR

$\therefore \triangle PTQ \cong \triangle STR$... آزمائش

$\therefore \angle TPQ \cong$ } (متماثل مثلثوں کے
 نظیری زاویے) اور $\cong \angle TRS$

ضلع $PQ \cong$


(متماثل مثلثوں کے نظیری اضلاع) ...

(4) ذیل کی شکل میں دی ہوئی معلومات کے مطابق


$\triangle LMN$ اور $\triangle PMN$ میں $LM = PN$ ،

$LN = PM$ ہو تو یہ مثلث کس آزمائش کے تحت متماثل ہیں لکھیے

اور بقیہ متماثل ارکان بھی لکھیے۔




شکل 3.23



شکل 3.24

(i)



شکل 3.20

شکل میں دی ہوئی معلومات کے مطابق،

$\triangle ABC$ اور $\triangle PQR$ میں،

$\angle ABC \cong \angle PQR$

قطعہ $BC \cong$ قطعہ QR

$\angle ACB \cong \angle PRQ$

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle PQR$ (آزمائش)

$\therefore \angle BAC \cong$


(متماثل مثلث کے نظیری زاویے)

قطعہ $AB \cong$ اور $\cong$ قطعہ PR

(متماثل مثلثوں کے نظیری اضلاع) ...

(3) ذیل کی شکل میں دی گئی معلومات کی مدد سے $\triangle ABC$ اور

$\triangle PQR$ کی متماثلت کی آزمائش اور بقیہ متماثل ارکان لکھیے۔



شکل 3.22

(5) شکل 3.24 میں، $AB \cong$ قطعہ BC اور


$AD \cong$ قطعہ CD ہو تو

ثابت کیجیے کہ $\triangle ABD \cong \triangle CBD$

(6) شکل 3.25 میں $\angle P \cong \angle R$ ، $PQ \cong QR$ قطعہ ہو تو

ثابت کیجیے $\Delta PQT \cong \Delta RQS$

شکل 3.25



آئیے سمجھ لیں

(Isosceles triangle theorem) متساوی الساقین مثلث کا مسئلہ

مسئلہ : اگر ایک مثلث کے دو ضلع متماثل ہوں تب ان ضلعوں کے مقابل کے زاویے متماثل ہوتے ہیں۔

دیا ہوا ہے : ΔABC میں، ضلع $AB \cong$ ضلع AC

ثابت کرنا ہے : $\angle ABC \cong \angle ACB$

عمل : ΔABC میں $\angle BAC$ کا نصف کھینچیے جو ضلع BC کو جہاں قطع کرتا ہے اس نقطہ کا نام D دیجیے۔

ثبوت : ΔABD اور ΔACD میں

دیا ہوا ہے) ... $AB \cong AC$ قطعہ

(عمل) $\angle BAD \cong \angle CAD$

(مشترک ضلع) $AD \cong AD$ قطعہ

... $\therefore \Delta ABD \cong \Delta ACD$

(متماثل مثلثوں کے نظیری زاویے) ... $\therefore \angle ABD \cong$ []

$\therefore \angle ABC \cong \angle ACB$ $\because B - D - C$

نتیجہ صریح : مثلث کے تینوں اضلاع متماثل ہوں، تب اس کے تینوں زاویے متماثل ہوتے ہیں اور ہر زاویہ کی پیمائش 60° ہوتی ہے۔ (آپ اس نتیجہ صریح کا ثبوت لکھیے)

(Converse of an Isosceles triangle theorem) متساوی الساقین مثلث کے مسئلہ کا عکس :

مسئلہ : اگر ایک مثلث کے دو زاویے متماثل ہوں تب ان زاویوں کے مقابل کے ضلع متماثل ہوتے ہیں۔

دیا ہوا ہے : ΔPQR میں $\angle PQR \cong \angle PRQ$

ثابت کرنا ہے : ضلع $PQ \cong$ ضلع PR

عمل : $\angle P$ کا نصف کھینچیے۔ جو ضلع QR کو جہاں قطع کرتا ہے۔ اس نقطہ کو M نام دیجیے۔

ثبوت : ΔPRM اور ΔPQM میں

دیا ہوا ہے) ... $\angle PQM \cong$ []


... $\angle QPM \cong \angle RPM$

(مشترک ضلع) ... $PM \cong$ [] قطعہ

... آزمائش ... $\therefore \Delta PQM \cong \Delta PRM$

متماثل مثلث کے نظیری اضلاع $\therefore PQ \cong PR$ قطعہ

شکل 3.27



نتیجہ صریح : مثلث کے تینوں زاویے متماثل ہوں تو اس کے تینوں اضلاع متماثل ہوتے ہیں۔ آپ اس نتیجہ صریح کا ثبوت لکھیے۔

اوپر دیے ہوئے دونوں ذیلی مسئلوں کے بیانات ایک دوسرے کے عکس ہیں۔

غور کیجیے



(1) کیا متساوی الساقین مثلث کے مسئلہ کا ثبوت، مختلف عمل کے ذریعے دے سکتے ہیں؟


(2) کیا متساوی الساقین مثلث کے مسئلہ کا ثبوت، کسی عمل کے بغیر دے سکتے ہیں؟

آئیے سمجھ لیں



$30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$ پیمائش کے مثلث کی خصوصیات (Property of $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$ triangle)

عملی کام I :



شکل 3.28

گروہ کے ہر طالب علم کو ایک ایسا قائمہ الزاویہ مثلث بنانے کے لیے کہیں

جس کا ایک زاویہ 30° کا ہو۔

ہر طالب علم 30° پیمائش کے زاویے کے مقابل کے ضلع اور وتر کی لمبائی ناپ لے۔

گروہ کا ایک طالب علم تمام طلبہ کے بنائے ہوئے مثلثوں کے لیے ذیل کا جدول مکمل کر لے۔

مثلثوں کے نمبر شمار	مثلث 1	مثلث 2	مثلث 3	مثلث 4
30° زاویہ کے مقابل کا ضلع				
وتر کی لمبائی				


اوپر کے جدول کی بنا پر زاویوں کی پیمائشیں 30° ، 60° اور 90° والے مثلث کے اضلاع کی کچھ خصوصیات حاصل ہوتی ہیں۔

عملی کام II : کمپاس بکس میں ایک گنیا کے زاویے 30° ، 60° اور 90° ہوتے ہیں کیا ان کے اضلاع کے تعلق سے یہ خصوصیت حاصل ہوتی ہے؟
تصدیق کیجیے۔

اس عمل کی بنا پر ہمیں حاصل ہونے والی ایک اہم خصوصیت کو اب ہم ثابت کریں گے۔

مسئلہ : اگر قائمہ الزاویہ کے حادہ زاویے 30° اور 60° کے ہوں تب 30° کے زاویے کے مقابل کا ضلع، وتر کا نصف ہوتا ہے۔

ذیل میں دیے ہوئے ثبوت کی خالی جگہ پُر کیجیے۔



شکل 3.29


دیا ہوا ہے : قائمہ الزاویہ $\triangle ABC$ میں $\angle B = 90^\circ$ ، $\angle C = 30^\circ$ ، $\angle A = 60^\circ$

ثابت کرنا ہے : $AB = \frac{1}{2} AC$

عمل : قطعہ AB کو نقطہ D تک اس طرح بڑھائیے کہ

$AB = BD$ اور قطعہ خط DC کھینچیے۔

ثبوت : $\triangle ABC$ اور $\triangle DBC$ میں



شکل 3.30

قطعہ $AB \cong$ قطعہ DB ...

$\angle ABC \cong \angle DBC$...

قطعہ $BC \cong$ قطعہ BC ...

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DBC$...

$\therefore \angle BAC \cong \angle BDC$... (متماثل مثلثوں کے نظیری زاویے)

$\therefore \angle BDC = 60^\circ$ ، $\angle BAC = 60^\circ$ میں $\triangle ABC$

اب $\triangle ADC$ میں

$\angle DAC = \angle ADC = \angle ACD = 60^\circ$... (مثلث کے زاویوں کا مجموعہ 180°)

$\therefore \triangle ADC$ ، یہ متساوی الاضلاع مثلث ہے۔

$\therefore AC = AD = DC$... (متساوی الساقین مثلث کے مسئلہ کے عکس کا نتیجہ صریح)

$AB = \frac{1}{2} AD$... (عمل)

$\therefore AB = \frac{1}{2} AC$ ($\because AD = AC$)

عملی کام : اوپر کی شکل 3.29 کی مدد سے خالی چوکون مکمل کر کے ذیل کے مسئلے کا ثبوت لکھیے

قائمہ الزاویہ مثلث میں دیگر زاویے 30° ، 60° ہوں تو 60° کے مقابل کا ضلع، وتر $\times \frac{\sqrt{3}}{2}$ ہوتا ہے۔

اوپر کے مسئلے میں، ہم جانتے ہیں، $AB = \frac{1}{2} AC$

$AB^2 + BC^2 =$... (فیثاغورث کے مسئلہ کی رؤ سے)


$\frac{1}{4} AC^2 + BC^2 =$

$\therefore BC^2 = AC^2 - \frac{1}{4} AC^2$

$\therefore BC^2 =$

$\therefore BC = \frac{\sqrt{3}}{2} AC$

عملی کام : قائمہ الزاویہ مثلث کے زاویے جب 45° , 45° , 90° ہوں تب قائمہ زاویہ بنانے والا ہر ضلع، وتر $\times \frac{1}{\sqrt{2}}$ ہوتا ہے۔



شکل 3.31

$$\triangle ABC \text{ میں، } \angle B = 90^\circ \text{ اور } \angle A = \angle C = 45^\circ$$

$$\therefore BC = AB$$

فیثاغورث کے مسئلہ کی روش سے،

$$AB^2 + BC^2 = \square$$

$$AB^2 + \square = AC^2 \quad \dots (\because BC = AB)$$

$$\therefore 2AB^2 = \square$$

$$\therefore AB^2 = \square$$

$$\therefore AB = \frac{1}{\sqrt{2}} AC$$

اس مسئلہ کو $45^\circ-45^\circ-90^\circ$ کے مثلث کا مسئلہ کہتے ہیں۔

اسے دھیان میں رکھیں



(1) قائمہ الزاویہ مثلث کے زاویے 30° , 60° , 90° ہوں تب 30° زاویے کے مقابل کا ضلع وتر $\frac{1}{2}$ ہوتا ہے اور 60° کے زاویے کے مقابل کا ضلع

وتر $\times \frac{\sqrt{3}}{2}$ ہوتا ہے۔ اس مسئلہ کو $30^\circ-60^\circ-90^\circ$ کا مسئلہ کہتے ہیں۔

(2) قائمہ الزاویہ مثلث کے زاویے 45° , 45° , 90° ہوں تب قائمہ زاویہ بنانے والا ہر ضلع وتر $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ہوتا ہے۔ اس مسئلہ کو


$45^\circ-45^\circ-90^\circ$ کا مسئلہ کہتے ہیں۔

آئیے ذرا یاد کریں



مثلث کا وسطانیہ (Median of a triangle)

مثلث کے راس اور اس کے مقابل کے ضلع کے وسطی نقطہ کو ملانے والا قطعہ خط، اس مثلث کا وسطانیہ کہلاتا ہے۔




شکل 3.32

شکل میں نقطہ D، ضلع BC کا وسطی نقطہ ہے اس لیے قطعہ AD، یہ $\triangle ABC$ کا

وسطانیہ ہے۔

عملی کام I :




شکل 3.33

کوئی بھی ایک مثلث ABC بنائیے۔ اس مثلث کے AD، BE اور CF وسطانیے کھینچئے۔ ان کے نقطہ تراکز کو G نام دیجیے۔ AG اور GD کی لمبائی کا موازنہ تقسیم کار (Divider) کی مدد سے کیجیے۔ AG کی لمبائی، GD کے دگنا ہے۔ اس کی تصدیق کیجیے۔

اسی طرح کیا BG کی لمبائی GE، کے دگنا اور CG کی لمبائی GF کی لمبائی کے دگنا ہوتی ہے؟ اس کی بھی تصدیق کیجیے۔

اس بنا پر ہندی وسط (تینوں وسطانیوں کا نقطہ تراکز) ہر وسطانیہ کو 2 : 1 اس کی نسبت میں تقسیم کرتا ہے۔ اس خصوصیت کو دھیان میں رکھیے۔




شکل 3.34

عملی کام II : ΔABC ، اس مثلث کو ایک موٹے کاغذ پر بنا کر کاٹ لیجیے۔ اس کے تینوں وسطانیہ کھینچئے۔ ان کے نقطہ تراکز کو نقطہ G نام دیجیے۔ اب ایک پنسل لیجیے جس کا نچلا حصہ ہموار ہو۔ ہموار حصے کو اوپر کی جانب کر کے اسے کھڑا کیجیے۔ مثلث کے نقطہ G کو پنسل کے ہموار حصے پر رکھ کر دیکھیے کہ توازن برقرار رہتا ہے۔ تصدیق کیجیے۔ اس بناء پر وسطانیوں کے نقطہ تراکز یا 'ہندی مرکز' کی اہم خصوصیت سمجھ میں آتی ہے۔



آئیے سمجھ لیں

قائمۃ الزاویہ مثلث کے وتر کے وسطانیہ کی خصوصیت



شکل 3.35

عملی کام : فرض کیجیے شکل 3.35 میں ΔABC قائمۃ الزاویہ مثلث ہے۔

قطعہ BD وسطانیہ ہے۔


تقسیم کار کی مدد سے درج ذیل قطعات خط کی لمبائیاں ناپ کر لکھیے۔

$$l(AD) = \dots\dots\dots l(DC) = \dots\dots\dots l(BD) = \dots\dots\dots$$

اس بنا پر $(BD) = \frac{1}{2} (AC)$ خصوصیت حاصل ہوتی ہے۔

تصدیق کیجیے۔

اب ہم اس خصوصیت کو ثابت کریں گے۔



شکل 3.32

مسئلہ : قائمہ الزاویہ مثلث میں، وتر پر کھینچے گئے وسطانیہ کی لمبائی وتر کا نصف ہوتی ہے۔

دیا ہوا ہے : قائمہ الزاویہ $\triangle ABC$ میں قطعہ BD وسطانیہ ہے۔

ثابت کرنا ہے : $BD = \frac{1}{2} AC$

عمل : شعاع BD، پر ایک نقطہ E اس طرح لیجیے کہ B - D - E ،

$l(BD) = l(DE)$ اور قطعہ EC کھینچیے ۔

ثبوت : ذیل میں ثبوت کے اہم مرحلے دکھائے گئے ہیں۔ درمیان کے مرحلے، بیانات اور وجوہات لکھ کر ثبوت مکمل کیجیے۔

$\triangle ADB \cong \triangle CDE$... (ضلع زاصل آزمائش)

قطعہ AB $\parallel$ قطعہ EC ... (متبادلہ زاویوں کی آزمائش)

$\triangle ABC \cong \triangle ECB$... (ضلع زاصل آزمائش)


$$BD = \frac{1}{2} (AC)$$

اسے دھیان میں رکھیں



کسی بھی قائمہ الزاویہ مثلث میں، وتر پر کھینچے گئے وسطانیہ کی لمبائی وتر کا نصف ہوتی ہے۔

مشقی سیٹ 3.3



شکل 3.37


(1) شکل 3.37 میں دیئے گئے زاویوں کی پیمائشیں دیکھیے۔ x اور y کی قیمتیں معلوم کیجیے۔ اسی

طرح $\angle ABD$ اور $\angle ACD$ کی پیمائشیں معلوم کیجیے۔

(2) قائمہ الزاویہ مثلث میں وتر کی لمبائی 15 ہو تب اس پر کھینچے گئے وسطانیہ کی لمبائی معلوم کیجیے۔

(3) قائمہ الزاویہ مثلث $\triangle PQR$ میں، $\angle Q = 90^\circ$ ، $PQ = 12$ ، $QR = 5$ اور QS قطعہ PR کا وسطانیہ ہے۔ تب QS کی قیمت


معلوم کیجیے۔



شکل 3.38

(4) شکل 3.38 میں $\triangle PQR$ کا نقطہ G ہندسی مرکز ہے۔ اگر $GT = 2.5$

ہو تو PG اور PT کی قیمتیں معلوم کیجیے۔



شکل 3.39


عملی کام : مناسب لمبائی کا قطعہ AB کھینچیے۔ اس کے وسطی نقطے کو M نام دیجیے۔ نقطہ M سے گزرنے والا اور قطعہ AB پر عمود ہو، ایسا خط l کھینچیے۔ خط l، قطعہ AB کا عمودی ناصف ہے۔ کیا یہ بات دھیان میں آگئی؟
خط l پر کہیں بھی نقطہ p لیجیے۔ PA اور PB کے فاصلوں کا موازنہ تقسیم کار کی مدد سے کیجیے۔ کیا حاصل ہوا؟ $PA = PB$ یہی حاصل ہونا؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قطعہ خط کے عمودی ناصف پر واقع کوئی بھی نقطہ، اس قطعہ خط کے اختتامی نقاط سے ہم فاصلہ ہوتا ہے۔

اب کمپاس کی مدد سے، نقطہ A اور B سے ہم فاصلہ نقاط C اور D جیسے کچھ نقاط لیجیے۔ تمام نقاط خط l پر ہیں نا؟ اس بات سے کیا سمجھ میں آیا؟ قطعہ خط کے سروں سے ہم فاصلہ ہر نقطہ، عمودی ناصف پر واقع ہوتا ہے۔ یہ دو خصوصیات عمودی ناصف کے مسئلہ کے دو حصے ہیں، اب ہم انھیں ثابت کریں گے۔



عمودی ناصف کا مسئلہ (Perpendicular bisector Theorem)

حصہ I : قطعہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہر نقطہ، اس قطعہ کے اختتامی نقاط سے مساوی فاصلہ پر ہوتا ہے۔



شکل 3.40

دیا ہوا ہے : خط l، قطعہ AB کا عمودی ناصف ہے، جو قطعہ AB کو نقطہ M پر قطع کرتا ہے۔

نقطہ P، خط l پر واقع کوئی ایک نقطہ ہے۔

ثابت کرنا ہے : $l(PA) = l(PB)$

عمل : قطعہ AP اور قطعہ BP کھینچیے۔

ثبوت : ΔPMA اور ΔPMB میں

(مشترک ضلع) ... $PM \cong PM$ قطعہ

(ہر زاویہ قائمہ) ... $\angle PMA \cong \angle PMB$


(نقطہ M وسطی نقطہ) ... $AM \cong BM$ قطعہ

$\therefore \Delta PMA \cong \Delta PMB$ (ضلع آزمائش) ...

$\therefore$ متماثل مثلثوں کے نظیری اضلاع ... $PA \cong PB$ قطعہ

$\therefore l(PA) = l(PB)$

اس بنا پر قطعہ خط کے عمودی ناصف پرواقع ہر نقطہ، اس قطعہ کے اختتامی نقاط سے ہم فاصلہ ہوتا ہے۔
 حصہ II : قطع خط کے اختتامی سروں سے ہم فاصلہ کوئی بھی نقطہ، اس قطعہ خط کے عمودی ناصف پرواقع ہوتا ہے۔
 دیا ہوا ہے : نقطہ P، قطعہ AB کے اختتامی نقاط سے مساوی فاصلے پرواقع کوئی نقطہ ہے۔ یعنی $PA = PB$
 ثابت کرنا ہے : نقطہ P، قطعہ AB کے عمودی ناصف پرواقع ہے۔
 عمل : قطعہ AB کا وسطی نقطہ M لیجیے اور خط PM کھینچیے۔



شکل 3.41

ثبوت : ΔPAM اور ΔPBM میں

$PA \cong PB$ قطعہ ...

$AM \cong BM$ قطعہ ...

$PM \cong$ (مشترک ضلع) ...

$\therefore \Delta PAM \cong \Delta PBM$... (آزمائش)

$\therefore \angle PMA \cong \angle PMB$... (متماثل مثلثوں کے نظیری زاویے)

$\angle PMA + \angle PMB = 180^\circ$ لیکن

$\angle PMA + \angle PMA = 180^\circ$... ($\because \angle PMB = \angle PMA$)


$2 \angle PMA =$

$\therefore \angle PMA = 90^\circ$

$PM \perp AB$ قطعہ ... (1)

(2) ... اسی طرح، ضلع AB کا وسطی نقطہ M ہے۔ (عمل)

اس لیے خط PM، قطعہ AB کا عمودی ناصف ہے۔ یعنی نقطہ P، قطعہ AB کے عمودی ناصف پرواقع ہے۔



شکل 3.42

زاویہ کے ناصف کا مسئلہ (Angle Bisector Theorem)

حصہ I : زاویہ کے ناصف پرواقع ہر نقطہ، اس زاویہ کی ساقین سے ہم فاصلہ ہوتا ہے۔

دیا ہوا ہے : شعاع QS یہ $\angle PQR$ کی ناصف ہے۔


A، زاویہ کے ناصف پرواقع کوئی ایک نقطہ ہے۔ QP شعاع $AB \perp$ قطعہ،

شعاع QR $AC \perp$ قطعہ

ثابت کرنا ہے : $AB \cong AC$ قطعہ

ثبوت : مثلثوں کی متماثلت کی مناسب و موزوں آزمائش کا استعمال کر کے ثبوت لکھیے۔

حصہ II : زاویہ کے سابقین سے مساوی فاصلہ پر واقع کوئی بھی نقطہ، اس زاویے کے ناصف پر ہوتا ہے۔



شکل 3.43

دیا ہوا ہے : $\angle PQR$ کے اندرون میں A ایک نقطہ اس طرح واقع ہے کہ،

قطعہ $AC \perp$ قطعہ QR

شعاع $QP \perp$ قطعہ AB


$$AB = AC$$

ثابت کرنا ہے : شعاع QA، $\angle PQR$ کی ناصف ہے یعنی

$$\angle BQA = \angle CQA$$

ثبوت : مثلث کی مناسب متماثلت کی آزمائش کا استعمال کر کے ثبوت لکھیے۔

آئیے ذرا یاد کریں



شکل 3.44

عملی کام I :

شکل کے مطابق، ضلع $XY <$ ضلع XZ

ایسا $\triangle XYZ$ بنائیے۔

اب $\angle Y$ اور $\angle Z$ ناپیے۔


کون سا زاویہ بڑا ہے؟

آئیے سمجھ لیں



مثالث میں ضلعوں اور زاویوں کی غیر مساویت کی خصوصیت :

مسئلہ : جب مثلث کے دو ضلعوں میں سے ایک ضلع، دوسرے ضلع سے بڑا ہوتا ہے تب بڑے ضلع کے مقابل کا زاویہ چھوٹے ضلع کے مقابل کے زاویے سے بڑا ہوتا ہے۔



شکل 3.45

دیا ہوا ہے : $\triangle XYZ$ میں $XY <$ ضلع XZ

ثابت کرنا ہے : $\angle XYZ >$ $\angle XZY$

عمل : ضلع XZ پر نقطہ P، اس طرح لیجیے کہ $l(XY) = l(XP)$ ، قطعہ YP کھینچیے۔

ثبوت : $\triangle XYP$ میں،

(عمل) ...

$$XY = XP$$

$$\therefore \angle XYP = \angle XPY \quad \dots (I) \quad \dots \text{ (متماثل اضلاع کے مقابل کے زاویے مساوی)}$$

$\angle XPY$ ، $\triangle YPZ$ کا خارجہ زاویہ ہے۔

$$\therefore \angle XPY > \angle PZY \quad \dots \text{ (خارجہ زاویہ کا مسئلہ)}$$

$$\angle XYP > \angle PZY \quad \dots \text{ بیان (I) کی بنا پر}$$

$$\angle XYP + \angle PYZ > \angle PZY \quad \dots \text{ (اگر } a > b \text{ اور } c > 0 \text{ ہو تو } a + c > b)$$

$$\therefore \angle XYZ > \angle PZY \text{ یعنی } \angle XYZ > \angle XZY$$

ثابت کرنا ہے : $AC > AB$

(ii)

(1) فرض کیجیے - $AC < AB$

چھوٹے ضلع کے مقابل کے زاویے سے ہوتا ہے۔

لیکن (دیا ہوا ہے) ... $\angle C < \angle B$

یعنی یہاں تضاد پایا جاتا ہے۔

∴ < ... (یہ مفروضہ غلط ہے)

لیکن (دیا ہوا ہے) ...

یعنی یہاں دوبارہ تضاد پیدا ہوتا ہے۔

∴ = ... (یہ مفروضہ غلط ہے)

اب یہی ایک ممکنہ مفروضہ باقی رہتا ہے۔ $\therefore AC > AB$...

$$\therefore AC > AB$$

آئیے ذرا یاد کریں



گزشتہ جماعت میں ہم نے ایک عملی کام کیا تھا۔ اس کی مدد سے مثلث کی

ایک خصوصیت دیکھی تھی، اسے یاد کریں۔

بازو کی تصویر کے مطابق مقام A پر ایک دکان ہے۔ سمیر C مقام پر کھڑا


تھا۔ دکان تک پہنچنے کے لیے اس نے $C \rightarrow B \rightarrow A$ اس پکی سڑک کی بجائے

$C \rightarrow A$ راستہ اختیار کیا۔ کیونکہ اس کے دھیان میں یہ بات آئی تھی کہ یہ راستہ کم

لمبائی کا ہے۔ یعنی مثلث کی کون سی خصوصیت اس کے دھیان میں آئی تھی؟

مثلت کے کوئی بھی دو ضلعوں کا مجموعہ تیسرے ضلع سے بڑا ہوتا ہے۔ اس

خصوصیت کو اب ہم ثابت کریں گے۔



مسئلہ : مثلث کے کسی بھی دو ضلعوں کی لمبائی کا مجموعہ تیسرے ضلع کی لمبائی سے بڑا ہوتا ہے۔

دیا ہوا ہے : $\triangle ABC$ کوئی ایک مثلث ہے۔

ثابت کرنا ہے : $AB + AC > BC$

$AB + BC > AC$

$AC + BC > AB$

عمل : شعاع BA پر نقطہ D اس طرح لیجیے کہ $AD = AC$

ثبوت : $\triangle ACD$ میں $AC = AD$... (عمل)

$\therefore \angle ACD = \angle ADC$... (متماثل اضلاع کے مقابل کے زاویے)

$\therefore \angle ACD + \angle ACB > \angle ADC$... (اگر $a > b$ اور $c > 0$ ہو تو $a + c > b$)

$\therefore \angle BCD > \angle ADC$


$\therefore$ ضلع $BD >$ ضلع BC ... (مثلث کے بڑے زاویے کے مقابل کا ضلع بڑا)

$\therefore BA + AD > BC$... ($\because BD = BA + AD$)

$BA + AC > BC$... ($\because AD = AC$)


$AB + BC > AC$ اسی طرح

ثابت کر سکتے ہیں۔ اور $BC + AC > AB$



شکل 3.47


مشقی سیٹ 3.4



شکل 3.48

(1) شکل 3.48 میں، نقطہ A، یہ $\angle XYZ$ کے ناصف پر واقع ہے۔

اگر $AX = 2$ سم ہو تو AZ معلوم کیجیے۔



شکل 3.49


شکل 3.49 میں $\angle RST = 56^\circ$ ، شعاع $ST \perp$ قطعہ PT قطعہ،

شعاع $SR \perp$ قطعہ PR اور قطعہ $PT \cong$ قطعہ PR ہو تو $\angle RSP$ معلوم کیجیے۔ وجہ لکھیے۔

(3) $\triangle PQR$ میں $PQ = 10$ سم، $QR = 12$ سم، $PR = 8$ سم ہو تو مثلث کا سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا زاویہ معلوم کیجیے۔

(4) $\triangle FAN$ میں، $\angle A = 40^\circ$ ، $\angle F = 80^\circ$ ہو تو مثلث کے سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے ضلع کے نام وجہ کے ساتھ لکھیے؟

(5) ثابت کیجیے کہ تساوی الاضلاع مثلث ”تساوی الزاویہ مثلث“ ہوتا ہے۔




شکل 3.50

(6) $\triangle ABC$ میں، $\angle BAC$ کا نصف، ضلع BC پر عمود ہو تو ثابت کیجیے کہ $\triangle ABC$ ،
متساوی الساقین مثلث ہیں۔

(7) شکل 3.50 میں اگر PQ قطعہ $\cong$ PR قطعہ ہو تو دکھائیے کہ

$$PQ > PS \text{ قطعہ}$$



شکل 3.51


(8) شکل 3.51 میں $\triangle ABC$ کے قطعہ AD اور قطعہ BD ارتفاع ہیں اور

$$AE = BD \text{ ہو تو ثابت کیجیے } AD \cong BE \text{ قطعہ}$$





متشابه مثلث (Similar Triangles)

مقابل کے اشکال کا مشابہہ کیجیے۔



ہر حصہ میں دکھائی ہوئی دو-دو شکلوں کی جسامت (Shape) ایک جیسی ہے۔ لیکن وہ شکلیں چھوٹی بڑی ہیں، یعنی وہ متماثل نہیں ہیں۔
ایسی ایک جیسی دکھائی دینے والی شکلیں، یعنی ایسی ہو بہو نظر آنے والی شکلیں متشابهہ شکلیں کہلاتی ہیں۔



کسی فوٹو، اس فوٹو کی مدد سے نکالا گیا بڑا فوٹو اس میں تشابہت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح راستہ اور راستے کا نقشہ میں تشابہت پائی جاتی ہے۔
دو شکلوں کے درمیان اضلاع کی تناسب، تشابہ اشکال کی اہم خصوصیت ہے۔ تشابہ شکلوں میں اگر زاویے ہوں تب وہ متماثل ہوتے ہیں، اُسی پیمائش کے رہنما ضروری ہے۔ دو راستوں میں جو زاویہ ہے، وہی زاویہ ان کے نقشہ میں نہ ہو تو وہ نقشہ غلط ہی پیدا کر سکتا ہے۔


ITC Tools or Links



موبائل یا کمپیوٹر پر کوئی فوٹو دیکھیے، اسے چھوٹا یا بڑا بنانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے یاد کیجیے۔
اسی طرح کسی فوٹو کا مخصوص حصہ دیکھنے کے لیے آپ کون سا عمل کرتے ہیں۔ یاد کیجیے۔


اب ہم تشابہ مثلث کی خصوصیت ایک عمل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔

عملی کام : 4 سم، 3 سم اور 2 سم ضلعوں والا ایک مثلث کاغذ پر بنائیے۔ اس مثلث کو ایک موٹے کاغذ پر رکھیے۔ اس کے اطراف پنسل گھما کر اس قسم کے 14 مثلث کاٹ کر تیار کیجیے۔ کاغذ کے یہ مثلثی ٹکڑے متماثل ہیں اس بات کو دھیان میں رکھیں۔ انھیں ذیل کے مطابق ترتیب دے کر تین مثلث بنائیے۔




شکل 3.52

مثلث کی تعداد 1



شکل 3.53

مثلث کی تعداد 4



شکل 3.54

مثلث کی تعداد 9

ΔABC اور ΔDEF ، یہ $ABC \leftrightarrow DEF$ مطابقت کے لحاظ سے تشابہ ہیں۔

$$\angle A \cong \angle D, \angle B \cong \angle E, \angle C \cong \angle F$$

اور

$$\frac{AB}{DE} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}; \quad \frac{BC}{EF} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}; \quad \frac{AC}{DF} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

یعنی نظیری ضلعے تناسب میں ہیں۔

اسی طرح ΔDEF اور ΔPQR پر غور کیجیے۔


$DEF \leftrightarrow PQR$ اس مطابقت کے لحاظ سے کیا ان کے زاویے متماثل اور ضلع تناسب میں ہیں؟




مثلثوں کی مشابہت

(i) $\angle A = \angle P$ ، $\angle B = \angle Q$ ، $\angle C = \angle R$ میں اگر $\triangle PQR$ اور $\triangle ABC$ ہو تو (ii) $\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{AC}{PR}$ اور $\triangle ABC \cong \triangle PQR$ ، 'مشابہ ہیں' اسے $\triangle ABC \cong \triangle PQR$ لکھتے ہیں۔
مثلثوں کے نظیری زاویے اور نظیری ضلعوں کے درمیان باہمی تعلق ذیل کے عملی کام سے سمجھ لیں۔

عملی کام : $\triangle A_1B_1C_1$ نام کا کوئی ایک مثلث دبیز کاغذ (کارڈ شیٹ) پر بنائیے اور اسے کاٹ لیجیے۔ $\angle A_1$ ، $\angle B_1$ اور $\angle C_1$ کی پیمائش ناپیے۔
اسی طرح دبیز کاغذ پر $\triangle A_2B_2C_2$ اور $\triangle A_3B_3C_3$ نام کے مزید دو مثلث بنائیے اس طرح کہ $\angle A_1 = \angle A_2 = \angle A_3$ ، $\angle B_1 = \angle B_2 = \angle B_3$ اور $\angle C_1 = \angle C_2 = \angle C_3$ لیکن $B_1C_1 > B_2C_2 > B_3C_3$ ۔
اب ان دو مثلثوں کو کاٹ کر بازو میں رکھیے۔ تینوں مثلثوں کے اضلاع کی لمبائی ناپیے۔ ان مثلثوں کو ذیل کے دونوں طریقے کے مطابق ترتیب دیجیے۔



شکل 3.55



شکل 3.56

ان نسبتوں کی جانچ کیجیے۔ وہ مساوی ہیں، یہ تصدیق کیجیے۔
 $\frac{A_1B_1}{A_2B_2}$ ، $\frac{B_1C_1}{B_2C_2}$ ، $\frac{A_1C_1}{A_2C_2}$

اسی طرح $\frac{A_1C_1}{A_3C_3}$ ، $\frac{B_1C_1}{B_3C_3}$ ، $\frac{A_1B_1}{A_3B_3}$ کیا یہ نسبتیں بھی مساوی ہیں، معلوم کیجیے۔

اس عملی کام سے یہ بات ذہن نشین کیجیے کہ جن مثلثوں کے نظیری زاویے مساوی پیمائش کے ہوتے ہیں، ان کے نظیری اضلاع کی نسبتیں بھی مساوی ہوتی ہیں۔ یعنی ان کے نظیری اضلاع یکساں تناسب میں ہوتے ہیں۔


ہم نے دیکھا کہ $\triangle PQR$ اور $\triangle ABC$ میں اگر (i) $\angle A = \angle P$ ، $\angle B = \angle Q$ ، $\angle C = \angle R$ ہو تب (ii) $\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{AC}{PR}$

یعنی اگر نظیری زاویے مساوی ہوں تب نظیری اضلاع یکساں تناسب میں ہوتے ہیں۔ اس اصول کو تھوڑی محنت سے ثابت کر سکتے ہیں۔ ہم اسے کئی مثالوں میں استعمال کرنے والے ہیں۔

اسے دھیان میں رکھیں



- دو مثلثوں کے نظیری زاویے مساوی ہوں تب، وہ دونوں مثلث متشابه ہوتے ہیں۔
- دو مثلث متشابه ہوتے ہیں تب ان کے نظیری اضلاع تناسب میں ہوتے ہیں اور نظیری زاویے متماثل ہوتے ہیں۔



مثال : شکل 3.57 میں $\triangle ABC$ اور $\triangle PQR$ دکھائے ہوئے ہیں۔

ان دو مثلثوں میں دی ہوئی معلومات کا مشاہدہ کیجیے۔ اس بناء پر جن کی لمبائیاں نہیں دی ہوئی ہو، ان اضلاع کی لمبائیاں معلوم کیجیے۔

حل : ہر مثلث کے تمام داخلہ کے زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ 180° ہوتا ہے۔
دی ہوئی معلومات کے مطابق،

$$\angle A = \angle P \text{ اور } \angle B = \angle Q, \therefore \angle C = \angle R$$

اس لیے $\triangle ABC$ اور $\triangle PQR$ متشابه الزاویہ ہیں۔

$$\therefore 4 \times PQ = 18$$

$$\therefore PQ = \frac{18}{4} = 4.5$$

$$6 \times AC = 7.5 \times 4, \text{ اسی طرح}$$

$$\therefore AC = \frac{7.5 \times 4}{6} = \frac{30}{6} = 5$$

$\therefore$ ان کے اضلاع یکساں تناسب میں ہیں۔

$$\therefore \frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{AC}{PR}$$

$$\therefore \frac{3}{PQ} = \frac{4}{6} = \frac{AC}{7.5}$$

مشقی سیٹ 3.5

(1) اگر $\triangle XYZ \sim \triangle LMN$ ہو تب ان کے متماثل نظیری زاویے لکھیے اور نظیری اضلاع کی نسبتیں لکھیے۔

(2) $\triangle XYZ$ میں $XY=4$ سم، $YZ=6$ سم، $XZ=5$ سم، اگر $\triangle XYZ \sim \triangle PQR$ اور $PQ=8$ سم ہو تو $\triangle PQR$ کے

بقیہ اضلاع کی لمبائیاں معلوم کیجیے۔

(3) متشابه مثلثوں کی جوڑی کی کچی (رف) شکل بنائیے۔ مثلثوں کے نام دیجیے۔ ان کے نظیری زاویوں کو یکساں نشانات سے دکھائیے۔ اور مثلثوں کے نظیری اضلاع کی لمبائیوں کو تناسب میں بتانے والے اعداد سے ظاہر کیجیے۔


آپے ذرا یاد کریں



آپ کو نقشہ بناتے وقت راستے پر فاصلہ مناسب پیمانے میں دکھانا ہے۔ جیسے میٹر 1 = 100 سم یا میٹر 1 = 50 سم۔
کیا آپ نے مثلث کی خصوصیت پر غور کیا؟ مثلث کے بڑے زاویے کے مقابل کا ضلع بڑا ہوتا ہے۔ ذرا یاد کیجیے۔

عملی کام :

آپ کے اسکول یا گھر کے اطراف کے 500 میٹر علاقہ کے راستے کا نقشہ تیار کرنا ہے۔ راستے کے دو مقام کے درمیان کا فاصلہ آپ کیسے ناپیں گے؟ عام طور پر 2 میٹر فاصلہ، آپ کتنے قدم چل کر طے کرتے ہیں؟ وہ دیکھیے۔ فرض کیجیے، دو میٹر فاصلہ میں تین قدم چلا جائے، تب اس تناسب سے 90 قدم یعنی 60 میٹر، اس طرح فرضی طور پر مقام طے کیجیے۔ مختصراً، اطراف کے تمام راستوں پر چل کر آپ کو مختلف فاصلے طے کرنا ہوگا۔ بعد میں جہاں راستے ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں وہاں جو زاویہ بنتا ہے اس کی پیمائش کا اندازہ لگائیے۔ راستے کی ناپی ہوئی لمبائی کے لیے مناسب پیمانہ لے کر نقشہ تیار کیجیے۔ اطراف کے دکانیں، چھوٹی دکانیں (پٹریاں)، عمارتیں، بس اسٹینڈ، آٹو رکشا اسٹینڈ وغیرہ ظاہر کرنے کی کوشش کیجیے۔ ذیل میں نقشہ کا ایک نمونہ دیا ہوا ہے اور اس کی فہرست بھی دی ہوئی ہے۔



فہرست : 1. کتابوں کی دکان 2. بس اسٹینڈ 3. اسٹیشنری دکان 4. بینک
5. میڈیکل اسٹور 6. ہوٹل 7. سائیکل کی دکان

(1) ذیل میں دیے ہوئے کثیر متبادل سوالوں کے جواب میں سے صحیح جواب منتخب کیجیے۔

(i) ایک مثلث کے دو اضلاع 5 سم اور 1.5 سم ہوں تب مثلث کے تیسرے ضلع کی لمبائی نہیں ہوگی۔

- (A) 3.7 سم (B) 4.1 سم (C) 3.8 سم (D) 3.4 سم


(ii) $\triangle PQR$ میں جب $\angle R > \angle Q$ ہو تو ہوگا۔

- (A) $QR > PR$ (B) $PQ > PR$ (C) $PQ < PR$ (D) $QR < PR$

(iii) $\triangle TPQ$ میں $\angle P = 95^\circ$ ، $\angle T = 65^\circ$ ہو تب درج ذیل بیانات میں سے صحیح بیان کون سا ہے؟

- (A) $PQ < TP$ (B) $PQ < TQ$ (C) $TQ < TP < PQ$ (D) $PQ < TP < TQ$


(2) $\triangle ABC$ متساوی الساقین مثلث ہے۔ جس میں $AB = AC$ ہے اور قطعہ BD اور CE دو وسطانیے ہیں تو دکھائیے کہ $BD = CE$



شکل 3.58

(3) $\triangle PQR$ میں اگر $PQ > PR$ ہے $\angle Q$ اور $\angle R$ کے ناصف ایک دوسرے کو

نقطہ S پر قطع کرتے ہیں۔ تو دکھائیے کہ $SQ > SR$



شکل 3.59

(4) شکل 3.59 میں $\triangle ABC$ کے ضلع BC پر نقطہ D اور E نقاط اس طرح واقع


ہیں کہ $BD = CE$ ، اسی طرح $AD = AE$ تو دکھائیے کہ

$$\triangle ABD \cong \triangle ACE$$


(5) شکل 3.60 میں $\triangle PQR$ کے ضلع QR پر نقطہ S کوئی ایک نقطہ ہے۔

ثابت کیجیے کہ

$$PQ + QR + RP > 2PS$$





شکل 3.60



- (6) شکل 3.61 میں $\triangle ABC$ کے $\angle BAC$ کا نصف قطعہ BC کو نقطہ D پر قطع کرتا ہے۔ ثابت کیجیے کہ $AB > BD$

- شکل 3.62 میں قطعہ PT، یہ $\angle QPR$ کا نصف ہے نقطہ R سے، قطعہ PT کے متوازی خط، شعاع QP کو نقطہ S پر قطع کرتا ہے۔ تو ثابت کیجیے کہ $PS = PR$



- (8) شکل 3.63 میں BC قطعہ $AD \perp$ قطعہ AE، یہ $\angle CAB$ کا نصف ہے اور $E - D - C$ ہو تو دکھائیے کہ
- $$m\angle DAE = \frac{1}{2} (m\angle C - m\angle B)$$

غور کیجیے



ہم نے سیکھا کہ دو مثلث متشابه زاویہ ہوں تب اُن کے نظیری اضلاع یکساں تناسب میں ہوتے ہیں۔ دو ذواربعۃ الاضلاع متشابه زاویہ ہوں تب کیا ان کے نظیری اضلاع یکساں تناسب میں ہوتے ہیں؟
مختلف شکلیں بنا کر تصدیق کیجیے۔
اس خصوصیت کو دیگر کثیر الاضلاع سے متعلق جانچیے۔

